

同前, 张学忠采; 2 ♂♂, 同前, 章有为采; 1 ♂, 同前, 1400m, 1998.VII.14, 王书永采; 8 ♀♀, 同前, 1400m, 1999.VII.4, 王洪建采; 2 ♂♂, 甘肃康县清河, 1470m, 1999.VII.1, 王洪建采; 4 ♀♀, 同前, 1380~1500m, 1998.VII.14, 王洪建采; 1 ♂, 甘肃康县白云山, 1250~1750m, 1998.VII.12, 袁德成采; 1 ♂, 甘肃康县黑马关, 1450~1550m, 1998.VII.13, 姚建采; 1 ♂, 甘肃宕昌大河坝沟, 1700~2300m, 1998.VII.19, 姚建采; 1 ♂, 甘肃舟曲沙滩林场, 2360m, 1999.VI.27, 王洪建采。

**中国其他记录:** 云南(维西、丽江、德钦、泸水)(郑乐怡, 1992)。

**分布:** 浙江、湖北、江西、福建、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃。

**(374) 高山狭盲蝽 *Stenodema (Stenodema) alticola* Zheng, 1981 (图 222 a~b)**

*Stenodema alticola* Zheng, 1981b: 57~58, 63; Zheng, 1981a: 93; Josifov & Kerzhner, 1999: 193.

体在属内相对宽短, 椭圆形。

头黑褐, 眼内侧色深, 头顶后缘中内有一对淡色斑。额伸出于唇基基部之上。头部毛长, 眼前方触角基外侧的毛长, 明显斜外伸。触角略带红色, 毛淡黑褐; 第Ⅰ节毛蓬松, 具多数直立毛, 长近该触角节直径; 第Ⅱ节毛长, 雌全长毛向端渐短, 毛长者近该触角节直径之2倍, 蓬松, 直立毛多; 雄毛较短, 基部1/2较长, 具直立毛, 长近该触角节直径。喙伸达中足基节端部。

前胸背板宽短, 中部淡褐, 通过胫区有一深色纵带贯全长, 胫黑; 中纵脊淡黄; 盘域侧区淡黄褐; 毛长而蓬松, 侧缘可见长毛, 胫毛平伏, 方向杂乱刻点稀。小盾片污褐。前翅缘片基部宽, 具 *S. holsata* 型特点; 爪片、革片内半黑褐, 其余淡黄褐; 革片毛半直立或近直立, 蓬松。

后足股节正常, 端部不缢束; 背面毛长而近直立, 其中长者等于或略长于后足胫节直径。后足胫节直, 内外侧毛均长, 直立毛多, 垂直或近垂直, 约为后足胫节直径之1~1.5倍。

量度(mm): 体长7.0~7.8, 体宽2.0~2.5。头长0.9~1.0, 头宽1.0~1.1, 头顶宽(♂)0.5~0.53, (♀)0.58~0.6。触角各节长0.8~0.95:2.0~2.2:0.85~1.0:0.7~0.8。前胸背板长1.33~1.38, 后缘宽1.7~1.95。革片长3.0~3.5, 楔片长0.68~0.93。

**模式标本:** 正模♂, 四川理县鹧鸪山, 3780~4000m, 1963.IX.14, 刘胜利采(存TMNH)(已检查)。

**观察标本:** 1 ♂(正模), 四川理县鹧鸪山, 3780~4000m, 1963.IX.14, 刘胜利采; 1 ♀(配模), 四川理县鹧鸪山, 3780~4000m, 1963.IX.14, 刘胜利采; 4 ♂♂1 ♀(副模), 四川理县鹧鸪山, 3780~4000m, 1963.IX.14, 刘胜利采; 1 ♂1 ♀(副模), 四川理县鹧鸪山, 3780~4000m, 1963.IX.14, 郑乐怡采。

中国其他记录：云南德钦白芒山 (郑乐怡, 1992)。

分布：四川、云南。




图 222 (a~b) 高山狭盲蝽 *Stenodema (Stenodema) alticola* Zheng;

(c~d) 西藏狭盲蝽 *Stenodema (Stenodema) tibetum* Zheng

a, c. 头及前胸背板 (head and pronotum); b. 后足胫节 (hind tibia); d. 后足股节与胫节 (hind femur and tibia)。

### (375) 瘦狭盲蝽 *Stenodema (Stenodema) angustata* Zheng, 1981 (图 223 d, h~i)

*Stenodema angustatum* Zheng, 1981b: 61, 63; Zheng, 1981a: 95, 97; Josifov & Kerzhner, 1999: 193.

体明显狭细，雄体尤显，宽为 1.68~1.75mm。色较灰暗，干标本榄褐色或榄绿色，带有黑褐色色泽。眼内侧黑，前胸侧缘为鲜明的淡黄色，胫黑，后叶侧缘内方成黑褐色纵带状，向内渐淡。小盾片基缘中央有一对小黑斑。爪片内角与接合缝后方 1/3 约成黑色。触角第 I 节毛黑褐色，较短而较为贴伏，角度在 30 度以下，常略弯，随后前指而与该节近平行，长度约为该节直径的 2.5/4~3/4；触角第 II 节长不超过 3.5mm。雄生殖囊开口在左阳基侧突着生处内侧几平，无突起，或只成很钝的角度略微突出，与 *nigricallum* 同。阳茎基部伸出 2 个长大的指形囊突，其一向一侧分支，成二岔状 (图 223d)。

色斑、体形、构造、毛被等均与 *S. nigricallum* 极似，触角第 I 节毛均相对较为贴伏而且较短，但雄虫身体较狭细，雄触角第 II 节明显短于 *nigricallum* (雌虫则该节长度相近)；前胸背板前叶较狭，侧缘于胫后缘处略弯，不若 *nigricallum* 雄虫于该处几直，在干标本中体色榄绿成分较显。此外，阳茎端构造不同。

量度 (mm)：体长 8.0~9.0，体宽 1.68~1.75。头长 0.9~1.0，头宽 0.95~1.05，头顶宽 (♂) 0.4~0.45，(♀) 0.48~0.5。触角各节长 1.1~1.15:2.62~3.0: