

monotypy.

*Reuterista* Kirkaldy, 1904: 280 (nom. nov. for *Brachybasis* Reuter, 1900).

*Calorisellus* Wagner, 1968: 163 (as subgenus of *Calocoris* Fieber, 1858). **Type species:** *Calocoris tegularis* Puton, 1888; by original designation. Synonymized by Linnavuori, 1986: 138.

体长椭圆形，两侧平行。毛被包括黑色刚毛状毛与淡色鳞状毛。淡黄色，有时具粉红色斑或具粉红色色泽。触角第Ⅱ节与小盾片均为淡色。头部的眼下部分仅为眼高的0.3~0.4倍。喙短，仅伸达中胸腹板中部。后足跗节第Ⅱ跗分节长约第Ⅰ节的2倍。

左阳基侧突的端突短，强烈扩展。阳茎端左膜叶长，分为两叶，各叶端部具微刺区。右膜叶具有与 *Closterotomus* 属的小微刺区同源的微刺区以及腹面的两处膜质区。*Calocoris* 属群中常见的简单针突缺；叉状骨化附器小，其分支退化成基部的短齿。雌虫支间叶内端具游离小叶；中突圆形 (Rosenzweig 1977)。

古北界荒漠-半荒漠地区分布。世界已知9种，我国记录1种。

### (332) 一色罗盲蝽 *Reuterista unicolor* Rosenzweig, 1997

*Reuterista unicolor* Rosenzweig, 1997: 153; Kerzhner & Josifov, 1999: 175.

作者未见此种标本，现摘译原记述如下：

体淡黄，一色，包括前翅翅基片 (tegula) 与膜片脉均为淡黄色 (此属内的大部分种类前翅翅基片黑色)，仅跗节末端与喙端黑色。前翅膜片灰色，透明。

头顶宽为眼宽的0.86~1.0倍 (♂)，或1.0~1.5倍 (♀)。触角第Ⅱ节长为前胸背板后缘宽的1.10~1.25倍；触角各节长比例为：2.4~3.0:10.0:5.0~6.0:3.0。喙伸达中胸腹板中央。

体长6.5~7.7mm，体宽2.0~2.5mm。

**中国分布记录：**新疆且末 (Cherchen) (Rosenzweig, 1997)。

**分布：**新疆；乌兹别克斯坦，土库曼。

## 64. 杆盲蝽属 *Rhabdomiris* Wagner, 1968

*Rhabdomiris* Wagner, 1968: 157 (as subgenus of *Calocoris*; upgraded by Rosenzweig, 1997: 168). **Type species:** *Cimex quadripunctatus* Villers, 1789 (= *Lygaeus striatellus* Fabricius, 1794); by original designation.

体中形，较狭长，两侧平行。底色污黄褐，半鞘翅脉两侧具黑色纹。体背面无刻点。毛一型，淡色，细，极短，平伏。

头顶中纵线隐约可见线纹状，后缘无横脊。触角窝位于眼内缘下半，下端几乎伸达眼下缘。触角较细长，第Ⅰ节较细，毛稀短；第Ⅱ节亚线形。

前胸背板领与胫区低平，盘域斜倾饱满，明显高于领及胫区；领约与触角第Ⅰ节等粗，无毛。二胫相连愈合，前伸达领后缘，侧方伸达前胸背板前侧角，其后缘界限清楚。

足细长。后足胫节刺淡色或黑色，基部无小黑点斑。后足跗节第Ⅰ跗分节不长于第Ⅱ节。爪在中央以后几以直角下弯。

左阳基侧突感觉叶具尖长的突起，端突不压扁，末端成一下弯的小钩。右阳基侧突向端渐细。阳茎端不对称，具一枚针突与数个大形膜叶；右膜叶在近次生生殖孔处具小形微齿区，在近针突基部具不规则的骨化区。针突细长，端部波状。次生生殖孔亚四方形。雌虫支间叶与大形的背结构密被微刺，支间叶具游离的骨化弯齿（Rosenzweig 1997）。

古北界分布。世界已知2种，我国均有记录。

### 种检索表

1. 小盾片具一对褐色中纵带。前胸背板侧缘前部有一由背面可见的短棱嵴；胫间区后有一短低嵴 …………… 纹盾杆盲蝽 *Rh. striatellus*  
 小盾片一色，无深色中纵带。前胸背板侧缘前部无明显的由背面可见的短棱嵴；胫间区后平坦，无嵴 …………… 美丽杆盲蝽 *Rh. pulcherrimus*

### (333) 美丽杆盲蝽 *Rhabdomiris pulcherrimus* (Lindberg, 1934) (图版Ⅶ-11)

*Calocoris pulcherrimus* Lindberg, 1934a: 16; Carvalho, 1959: 45; Schuh, 1995: 715.

*Rhabdomiris pulcherrimus* (Lindberg): Rosenzweig, 1997: 168; Kerzhner & Josifov, 1999: 175.

体狭长，两侧近平行，极轻微地外拱。毛一型，淡色，略弯，平伏或半平伏，有闪光，细，丝状，不加宽成鳞片状。

底色黄绿，有黑色斑纹，有光泽。

头背面均匀饱满，但不甚圆隆，光裸无毛。头顶中纵沟隐约可见，其两侧前后各具一对微刻区，前方者约成卵圆形，后方者约成后弯的宽弧形，外端加粗而且下凹；唇基与额间具很浅的横缢或无横缢，唇基侧面观均匀加高，几不突然隆出。头黑，有毛泽，触角窝内侧纵带黄色，沿眼内缘后延；额前端有2~3个黄色小斑；淡色个体则额淡黄褐，具三叉形黑纹，头顶黑。触角第Ⅰ节黑，或淡黄褐至淡锈黄色，细长，全长粗细一致，长度的一半伸过唇基末端，毛被短小，较稀，半平伏；第Ⅱ节长，亚线形，全黑，或大部淡色，端部黑褐，端部约与第Ⅰ节等粗，毛细短整齐，密，半平伏；第Ⅲ、Ⅳ两节线形，粗约为第Ⅱ之半，黑色。喙伸达中足基节端部。

前胸背板领显著，几与触角等粗，淡黄，无毛，无光泽。二胫相连愈合，饱满，光滑，光泽强；前胸背板侧缘直，后侧角宽圆，后缘中段几直，中央微前凹；盘域较圆隆