

1.25; 头顶宽 (♂) 0.55~0.60, (♀) 0.63~0.70。触角各节长 (♂) 1.38~1.45:3.25~3.60:1.45~1.68:1.43~1.50; (♀) 1.50~1.63:3.25~3.65:1.33~1.80:1.0~1.75。前胸背板长 1.25~1.55; 后缘宽 1.55~2.18。革片长 3.63~4.83; 楔片长 0.80~1.08。

模式标本: 选模♀, 四川宝兴 (存 MNHN) (未检查)。

观察标本: 1♂, 福建邵武, 1948.VI.26~30; 1♀, 福建建阳拗头, 1965.VI.10, 王良臣采; 1♂, 湖北房县桥上, 1977.VI.16, 邹环光采; 2♀♀, 湖北神农架红坪, 1977.VII.1, 穆强采; 1♂, 四川峨眉山洪椿坪, 1500m, 1957.VI.12, 郑乐怡、程汉华采; 3♂♂, 四川宝兴硃碛, 2200~2700m, 1963.VI.25, 郑乐怡采; 2♂♂1♀, 四川宝兴至硃碛途中, 1963.VI.25, 邹环光采; 1♀, 西藏吉隆乃下, 1984.VIII.13, 普琼琼采; 1♀, 西藏吉隆, 1984.IX.28, 闫兆兴采; 1♂8♀♀, 陕西留坝庙台子, 1470m, 1999.VII.1, 姚建采; 2♂♂2♀♀, 同前, 刘缠民采; 2♂♂1♀, 同前, 贺同利采; 2♂♂1♀, 同前, 1999.VII.2, 朱朝东采; 3♂♂2♀♀, 陕西留坝苇沱沟, 1600m, 1998.VII.21, 陈军采; 1♂, 同前, 廉振民采; 1♂1♀, 同前, 袁德成采; 2♂♂, 陕西周至厚畛子, 1350m, 1999.VI.24~25, 胡建采; 1♂, 同前, 1999.VI.24, 刘缠民采; 1♂2♀♀, 陕西宁陕火地塘, 1580m, 1998.VII.26, 袁德成采; 1♀, 同前, 张学忠采; 2♂♂, 陕西宁陕火地塘鸦雀沟, 1600~1700m, 1998.VII.28, 陈军采; 1♂, 陕西宁陕火地塘大水沟, 1500~1760m, 1999.VI.30, 袁德成采; 2♂♂1♀, 陕西佛坪凉风垭, 1800~2100m, 1999.VI.28, 刘缠民采; 2♂♂2♀♀, 甘肃文县邱家坝, 2350m, 1998.VII.21, 王洪建采; 2♀♀, 同前, 2000m, 1999.VI.20, 王洪建采; 9♂♂3♀♀, 同前, 2100m, 1998.VII.1, 姚建采; 5♂♂5♀♀, 同前, 杨星科采; 3♂♂, 同前, 2200~2350m, 1998.VI.29, 陈军采; 1♂1♀, 同前, 2000~2100m, 1998.VII.1, 张学忠采; 13♂♂13♀♀, 甘肃文县铁楼科桥村, 1500m, 1999.VI.23, 王洪建采; 1♂, 甘肃文县刘家坪, 2100m, 1998.VI.27, 张学忠采; 1♀, 甘肃文县碧口碧峰 900~1450m, 1998.VI.25, 陈军采; 6♂♂6♀♀, 甘肃康县清河林场, 1440m, 1999.VII.7, 王洪建采; 1♀, 同前, 1999.VII.9, 王洪建采; 4♂♂1♀, 同前, 1450~1650m, 1998.VII.15, 杨星科采; 2♀♀, 同前, 姚建采; 1♂2♀♀, 同前, 1400m, 陈军采; 1♂, 同前, 1998.VII.14, 王书永采; 2♂♂, 同前, 朱朝东采; 2♀♀, 甘肃康县清河, 1380~1500m, 1998.VII.14, 王洪建采; 1♀, 甘肃宕昌黄泉路, 2700m, 1998.VII.8, 王洪建采; 1♀, 甘肃舟曲沙滩林场, 2360m, 1999.VI.27, 王洪建采。

中国其他记录: 云南维西 (郑乐怡, 1992)。

分布: 浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南、陕西、甘肃、台湾。

(381) 扩翅狭盲蝽 *Stenodema (Stenodema) holsata* (Fabricius, 1787)

Cimex holsatum Fabricius, 1787: 306.

Stenodema holsatum (Fabricius): Carvalho, 1959: 303; Zheng, 1981a: 93, 96; Nonnaizab & Jorigtoo, 1994: 85, 86; Josifov & Kerzhner, 1999: 194.

体椭圆形，相对宽短，身体最宽处约在爪片末端的水平。绿色或灰绿色，干标本黄褐或暗褐色。

头部背面观长略大于宽，眼内侧有时有深色宽带。额不伸过唇基，不遮盖于唇基基部之上；唇基与额之间的凹纹较清楚。触角略短于身体，污黄褐色；第 I 节略长于头部，长约为直径的 5 倍，毛密，淡黑褐，近平伏，长约为直径之半，全无大角度长毛；第 II 节明显短于第 III、IV 节之和，毛两类，甚短，均为淡色刚毛状，一类近平伏，较短密，另一类斜伸，后者较长而较稀。两性个体触角节全长的毛长度一致。

前胸背板较短宽，较平，前倾程度甚弱，两侧经胝具黑褐色纵带；刻点细密，淡色纵中线或多或少明显，成嵴状；侧缘凹弯，后缘平直；毛短小。

小盾片中纵纹淡黄，纹的两侧色深，黑褐色，向两侧渐淡。前翅相对较短；缘片甚宽，基部更显，致使二前翅静止时明显宽于前胸背板后缘。爪片及革片内半污褐至黑褐；爪片脉两侧区域色深，革片内半深色区的外缘与爪片接合缘平行，其后段与中部纵脉一致，此区域的外方色深，Cu 脉色浅。革片外半及缘片淡黄，此区域相对甚宽，约与深色部分等宽。革片毛短，平伏，淡色，具闪光，短小；刻点极浅，密。楔片一色淡黄，短宽，毛同革片，但略疏。膜片黑褐。

足淡污褐，后足股节下方无刺，端部不缢束。后足胫节直，相对较短，毛短于该胫节直径，角度小。

量度 (mm): 体长 7.2, 体宽 2.2。头长 1.0, 头宽 1.1, 头顶宽 (♀) 0.58。触角各节长 0.9:2.0:1.3:1.1。前胸背板长 1.25, 后缘宽 1.8。革片长 3.2, 楔片长 0.80。

观察标本: 1♀, 新疆哈巴河铁烈克提, 1975.VIII.14。

中国其他记录: 内蒙古兴安盟科右前旗 (能乃扎布、照日格图, 1994)。

分布: 内蒙古、新疆; 哈萨克斯坦, 蒙古, 西伯利亚, 欧洲。

(382) 萧氏狭盲蝽 *Stenodema (Stenodema) hsiao* Zheng, 1981 (图 225 b~c, e, h, k~l; 图 226 f)

Stenodema hsiao Zheng 1981a: 95, 98; Josifov & Kerzhner, 1999: 194.

体长度及宽度中等，灰黄褐色或灰绿色。

头在眼内侧成黑褐色带，最宽时头中线的淡色部分与两侧黑带等宽，贯全长，后延为前胸背板各侧的黑色纵带，达于前胸背板后缘，几覆盖胝区全部。额端突伸覆盖于唇