

基基部之上。触角污黄褐色或淡污褐色；第Ⅰ节相对细长，毛浓密，半平伏，斜前伸，微弯，与触角节同色或略深，直立长毛极少或无，毛最长者约为该触角节直径之半，多数更短；雌虫第Ⅱ节基部 $1/3 \sim 2/5$ 毛略长，向端渐短，斜伸，最长者接近该节直径；其后的短毛半平伏，短小而密；无直立长毛；雄第Ⅱ节只最基部毛稍长，其余均短密而细，毛色淡于第Ⅰ节者，较直，几乎平伏，杂有少量半直立或直立小毛。喙伸达中足基节末端。

前胸背板侧缘较凹弯，后缘中央常明显前凹，略呈心形。小盾片大部黑褐，黄色中纵带明显，其两侧加深成宽黑带状。

革片一色黄绿，或中部纵脉以内加深成浅黑褐，成晕状，爪片脉两侧色常加深，深时可成黑褐色宽带。爪片内缘黑褐。雄虫色常较深。半鞘翅毛平伏，较 *S. alpestris-elegans* 相对长密。

后足股节端部较突然地变细，股节腹面在变细前的部分密生成片的短小毛丛，该处的毛弯曲而平伏，呈丝状毛型，此密毛区域可延续甚长，达股长之半。后足胫节基部弯曲，毛长度不均一，较为杂乱蓬松，最长者约等于该胫节直径，角度为 45 度或更小；与邻近种 *S. turanicus* 相比，毛更短而斜度更大。

雄虫阳基侧突与 *turanicus* 相近；阳茎端基部的两个囊突短，端部左侧有一较大的




图 225 (a, d, f~g, i~j) 中亚狭盲蝽 *Stenodema (Stenodema) turanica* Reuter;

(b~c, e, h, k~l) 萧氏狭盲蝽 *Stenodema (Stenodema) hsiao* Zheng

a~b. 阳茎端 (vesica); c~d. 触角第Ⅰ节及第Ⅱ节基部 (antennal segment I and basal portion of segment II);

e~f. 后足胫节 (hind tibia); g~h. 右阳基侧突 (right paramere); i~l. 左阳基侧突 (left paramere)。




图 226 (a, c~d) 中亚狭盲蝽 *Stenodema (Stenodema) turanica* Reuter;

(b, e) 绿狭盲蝽 *Stenodema (Stenodema) virens* (Linnaeus);

(f) 萧氏狭盲蝽 *Stenodema (Stenodema) hsiaoi* Zheng

a~b. 交配囊后壁 (posterior wall of bursa copulatrix); c. 阳茎端 (vesica);

d~f. 环骨片 (ring sclerite)。

囊突 (图 225b), 与 *turanicus* 不同。

量度 (mm): 体长 7.6~9.5, 体宽 1.6~2.15。头长 0.9~0.95, 头宽 0.95~1.05, 头顶宽 (♂) 0.45~0.5, (♀) 0.5~0.55。触角各节长 1.1~1.4:2.9~3.1:1.15~1.4:0.9~1.1。前胸背板长 1.25, 后缘宽 1.5~1.85。革片长 3.5~4.2, 楔片长 0.88~0.97。

模式标本: ♂ (正模), 四川小金新街, 2350m, 1963.VIII.26, 郑乐怡采 (存 NKU) (已检查)。

观察标本: 1 ♂ (正模), 四川小金新街, 2350m, 1963.VIII.26, 郑乐怡采; 1 ♀ (配模), 四川金川城关, 2000~2300m, 1963.IX.7, 邹环光采; 1 ♂, 四川西昌, 1957.VIII.2; 1 ♀, 四川宝兴晓碛, 1963.VI.23; 4 ♂♂ 8 ♀♀, 四川汶川威州, 1450m, 1963.VII.17, 郑乐怡采; 1 ♀, 四川茂县凤仪, 1500m, 1963.VII.20, 郑乐怡采; 1 ♀, 四川理县刷经寺, 3150m, 1963.VIII.2, 郑乐怡采; 11 ♀♀, 四川马尔康, 1963.VIII.21; 3 ♂♂