

观察标本：西藏，扎达底雅马阳，3500m，1976. VI. 29, 1♀, 韩寅恒采。

分布：西藏（扎达）。

(107) 黑腹黄斑蜂 *Anthidium* (s. str.) *nigroventralis* Wu, 1982 (图 83)

*Anthidium nigroventralis* Wu 1982, Insects of Xizang, 2: 410. China: Xizang.

雄性：9mm。体具密刻点；唇基、眼侧较大而浅；颜面及颅顶较细密；额唇基基部光滑；颊、胸部及中胸侧板刻点密集；腹部背板稀而浅；触角第1鞭节长于第2节，第2节等于第3节；腹部第7~8节腹板及生殖节如图83。体黑色，仅唇基、眼侧（触角窝以下）黄色；上颚大部分、颅顶两侧具椭圆形黄斑；腹部全部黑色；各腹板端缘及跗节褐色。唇基、颜面及胸侧下半部被白色长毛；颅顶被黄毛；胸部背板密被浅黄色毛；颊毛黑色，仅近上颚基部被少量白毛；中胸侧板基半部被黑毛；腹部第1~2节背板及第3节背板基部毛黑色，部分毛尖褐色；第1~2节腹板被黑褐色短毛；第3~7节背板及腹板均被狐红色毛；前足腿节及胫节外侧毛长，白色；中足及后足腿节及胫节外侧被黑褐色长毛；各跗节毛红褐色。




图 83 黑腹黄斑蜂 *A. (s. str.) nigroventralis* Wu

a. 第8腹板 b. 第7腹板 c. 生殖节 d. 第7背板

观察标本：西藏，普兰，5400m，1976. VII. 21, 1♂, 黄复生采。

雌性：未明。

分布：西藏（普兰）。