

2♂；崇安，260m，1960. VII. 9, 2♂，蒲富基采；建阳黄坑，1960. VI. 20, 2♂王书永采；建阳，1937. VI. 20, 1♂；山东，济南，8♀, 116♂；烟台，1961. VI. 19, 1♂，陈泰鲁采；泰安，1973. VI. 7, 1♀，王淑芳采；泰山，1973. VI. 3~12, 1♀, 4♂，吴燕如、王淑芳采；海南，1924. VI. 19, 1♀，何琦采；新疆，尼勒克，850~1250m, 1957. VII. 25, 2♂，洪淳培、汪广采；乌鲁木齐，580m, 1959. IX. 8, 1♂，王书永采；托克逊，1958. VI. 22, 1♂，李常庆采。

分布：北京、江苏（南京、镇江）、浙江（天目山）、安徽（宁国）、福建（福州、崇安、建阳）、山东（青岛、烟台、泰安、泰山）、海南、新疆（尼勒克、托克逊、乌鲁木齐）；北非（摩洛哥），欧洲至北纬55度，中亚（乌兹别克斯坦，塔吉克斯坦，哈萨克斯坦），以色列。

(150) 红尾尖腹蜂 *Coelioxys (Allocelioxys) echinata* Foerster, 1853 中国新记录种

Coelioxys octodentata Lepeletier, 1841, Hist. Nat. Ins. Hym., 2: 524.

Coelioxys ruficauda Lepeletier, 1841, Hist. Nat. Ins. Hym., 2: 524.

Coelioxys echinata Foerster, 1853, Verh. Nat. Ver. press. Rheinld, 10: 279.

Coelioxys rufocaudata Smith, 1854, Cat. Hym. Brit. Mus., 2: 260.

Coelioxys (Allocelioxys) echinata Foerster, 1992, Warncke, Bericht. Naturkf. Gesellcht. Augsburg., : 50~52.

雌性：8~9mm。体黑色，翅浅褐色，腹部第1~5节背板端缘具白鳞毛带。上颚3齿；颅顶端缘凹较浅；颊最宽处为复眼宽的1/2，无颊窝；前足基节正常；头及胸部刻点大而密；腹部第2~3节背板横沟完整；第1~4节背板刻点大而稀；第5~6背板刻点较小；第6节背板端半部具脊，第6背板及腹板渐变窄；第6腹板亚端部无凹刻，向下弯；第6腹板自由端为第6背板自由端长的2倍；顶端钝圆；颜面及胸部密被白直毛；中胸盾片中央及小盾片基部被稀的白鳞毛；第1背板两侧被白鳞毛斑；第1~5背板端缘具白鳞毛带；胫节外侧被白鳞毛；跗节内表面被黄褐色毛；第2~5节腹板端缘具宽的白鳞毛带。上颚（顶端黑色）、触角鞭节、前足胫节及跗节褐色；中足及后足、翅基片均黑褐色；翅脉及翅痣均褐色。

雄性：7~8mm。与雌性主要区别为：第5背板端侧具齿；第6背板具8齿：基侧各1齿，中央6齿：上排4齿，下排2齿；第4腹板端缘中央无凹；触角及足均黑色；腹部背板毛带中央窄，仅1排鳞毛；第2背板无侧窝。

寄主：*Megachile apicalis*、*M. rotundata* (Warncke, 1992)。

观察标本：新疆，昭苏。

分布：新疆（昭苏）；非洲（摩洛哥，阿尔及利亚，安哥拉，肯尼亚），土耳其，欧洲至北纬53度东至里海。