

分布：甘肃。

(183) 十四齿尖腹蜂 *Coelioxys quartodecimdentata* Friese, 1935

*Coelioxys* 14-dentata Friese, 1935, Notes D'Ent. Chinoise, 2 (7): 158~159. Zhejiang (Zhaoshan)

*Coelioxys quartodecimdentata* Friese: Wu, 1941, Cat. Ins. Sin., 6: 304.

雄性：10mm。体黑色，第2~4节背板端缘具白鳞毛带。上颚3齿；颊最宽处与复眼几等宽；颊窝大、深且光滑；小盾片端缘中央稍隆；腋齿长且钝，向内弯；腹部背板刻点大；第2~4节背板两侧各具1尖隆突；第5节背板端侧各1齿；第6节背板具6齿：两侧齿、中部4齿：上排2齿较扁，下排2齿较细长。翅基部透明；翅基片及翅脉黑色。

雌性：未明。

分布：浙江（舟山）。

(184) 黄头尖腹蜂 *Coelioxys fulviceps* Friese, 1911

*Coelioxys fulviceps* Friese, 1911, Zool. Bot. Wien, p. 128; Friese, 1935, Not. D'Ent. Chin., 2 (7): 156. Taiwan (Tainan), Guangdong.

雌性：12mm。体黑色密被毛；体黄褐色或黄红色。上颚2齿；触角长达小盾片；头部及胸部刻点粗，似革状；小盾片明显革状，端缘中央刺状；腋齿大；腹部刻点深、分散、闪光；第6节背板短粗、端部尖，脊两侧具不明显的凹；第6腹板流线形，顶端尖，似背板，亚端部具不明显的侧齿。翅透明，边缘蓝紫色；翅脉黑褐色；翅基片黑色；足黑色；距黄褐色。足被浅黄色毛，跗节基部毛黄褐；第6腹板端部浅黄色。腹部第1~5节背板端缘具一排白鳞毛带。

雌性：未明。

分布：广东、台湾（台南）。

(185) 鼻尖腹蜂 *Coelioxys rhinosa* Cockerell, 1911

*Coelioxys rhinosa* Cockerell, 1911, Entomologist, : 342. Formosa; Cockerell, 1927, Amer. Mus. Nov., 274: 9.

雌性：11mm。体黑色，被白毛。上颚宽，表面具斜脊；唇基粗刻点，中央具纵脊，侧观似鼻，端缘具小结；额皱状；颅顶刻点大；中胸及小盾片刻点密且深；小盾片角状，中部无齿；腋齿短；腹部刻点密且深；第2~3节背板具横沟；第6节背板很长，脊明显；第6腹板细长，顶端尖，长于背板约0.5mm，无侧齿。触角、上颚及足均黑色；翅基片暗锈色；翅褐色，基部透明；颜面密被浅褐色毛；腹部具窄的白毛带，两侧