

较宽。

雄性：未明。

分布：台湾。

(186) 暹罗尖腹蜂 *Coelioxys siamensis* Cockerell, 1927

*Coelioxys siamensis* Cockerell, 1927, Proc. U. S. Nat. Mus., 40: 246; 1927, Amer. Mus. Nov., 274: 10. Yen-ping.

雌性：12mm。体黑色，被白毛。颅顶刻点粗大；中胸及小盾片刻点粗大，小盾片的刻点较稀，端缘向上翘，中央稍突出，腋齿粗大；腹部刻点粗大且稀；端节刻点细小，顶端具窄脊；第6腹板长圆锥形，长于背板并向下弯；腹板基部刻点稀，顶端呈横纹状。复眼浅绿色，毛短且厚；颜面密被白毛；颊密被白毛；前胸、中胸侧缘、肩突及后胸被白毛；翅基片后1白毛斑；小盾片基缘1对白毛斑；小盾片侧齿下一撮白毛。翅基片褐色；翅端半部暗褐色；距暗红褐色；腹部具紫色光泽，背板端缘具白色中断的窄毛带。

雄性：未明。

分布：广东（Yen-ping）、福建（南平）；泰国，马来半岛。

(187) 台湾尖腹蜂 *Coelioxys taiwanensis* Cockerell, 1927

*Coelioxys taiwanensis* Cockerell, 1927, Amer. Mus. Nov., 274: 10. Formosa.

*Coelioxys taiwanensis* var. *kellogi*, 1930, Ann. Mag. Nat. Hist., London, 10 (6): 50-51.

雄性：8mm。颅顶刻点大；中胸及小盾片具粗刻点；颊端部具脊；小盾片端缘几乎直，两侧各具1小齿；腋齿短。体黑色，包括上颚（除外齿红色）、触角、翅基片及足（除跗节褐色）；翅透明，翅脉色暗；翅痣黄褐色；翅脉黄色；距浅红色；腹部背板刻点粗大；第1节腹板端缘黄褐色；第4腹板黑色具密刻点，端缘深凹被白毛，膜质边缘横跨其间的沟；第5腹板浅黄褐色，细毛遮于中部；第6腹板基部两侧被由白毛形成的铅笔状斑，被一大的红色膜片重叠；第5背板两侧具小角，非齿状；腹部顶端具8齿：两侧各具1长齿，上排4齿，下排2齿长。体毛奶白色，除小盾片基部的斑为浅褐色；中胸基缘具一对远离的白毛斑，斑间有分散的鳞毛；小盾片基部具一对大毛斑，顶端有分散的浅黄色鳞片；腹部具完整的带；复眼浅褐色，被很短的毛。

雌性：未明。

分布：福建（福州）、台湾（台南）。