

图 133 毛唇尖腹蜂 *C. (S.) piliclypeus* Wu

a. ♀ 第 6 背板及腹板 ♂: b. 第 6~7 背板 c. 第 6 腹板 d. 第 8 腹板 e、f. 生殖节背面及腹面观

2300m, 1983. VIII. 15~28, 3♀, 韩寅恒采。

分布: 云南 (中甸)、西藏 (波密易贡)。

(177) 云南尖腹蜂 *Coelioxys (Schizocoelioxys) yunnanensis* Wu, 1992 (图 134)

*Coelioxys yunnanensis* Wu, 1992, Ins. Hengduan Mt. Reg., 2: 1402. China: Yunnan.




图 134 云南尖腹蜂

*C. (S.) yunnanensis* Wu  
第 6 背板及腹板

雌性: 12mm。体黑色, 被白毛。触角第 2 节与第 3 节等长; 上颚 2 齿; 唇基及颜侧刻点较颅顶小; 颊及颅顶边缘具脊; 胸部刻点与颅顶相似; 小盾片端缘稍隆起; 腋齿钝并向内弯曲; 腹部刻点不一致, 第 1 节刻点粗大, 第 2~3 节背板横沟中断; 第 2 节基半部刻点小而密, 端半部大而稀; 第 3 节似第 2 节, 但基半部较第 2 节稀; 第 4~5 节刻点似第 3 节端半部; 第 6 节背板刻点较小而密, 端部伸长, 顶端圆; 第 6 腹板长于背板, 两侧角状, 中央稍突出。翅基片及足黑褐色; 第 1 腹板端缘红褐色; 翅浅褐色, 端缘深。体毛较长; 唇基及颜面密被灰黄色长毛; 颊、胸侧及并胸腹节密被白长毛; 腹部第 1

节两侧, 第 2~5 节背板端缘具白毛带。

雄性: 未明。

观察标本: 云南, 维西攀天阁, 2500m, 1981. VII. 24, 1♀, 张学忠采; 西藏, 林芝, 3000m, 1983. VI. 31, 1♀, 韩寅恒采。

分布: 云南 (维西攀天阁)、西藏 (林芝)。