

(43) 沟脊孔蜂 *Heriades* (s.str.) *cancavus* Wu, 1982 (图 27)

*Heriades cancavus* Wu, 1982, Insect. Hengduan Mt. Reg., 2: 406. China: Xizang.

雄性: 5mm。上颚窄, 3齿, 外齿尖, 第2、3齿可区分, 表面具稀且大的刻点; 唇基宽约为长的2倍, 稍隆起, 表面具粗大呈纵排的刻点; 触角柄节较粗, 第3节球状, 长约等于第4节; 第4节宽大于长, 第5节短于3+4; 触角窝至复眼顶角处呈浅沟状凹; 颊稍窄于复眼最宽处; 颜面、颊、颅顶均被密而粗大的刻点; 中胸、小盾片及胸侧刻点较头部稀; 后胸粗, 分不清刻点, 约与并胸腹节等宽; 并胸腹节基部具纵皱; 腹部第1节背板端缘具不甚明显的脊; 第2节背板基部具横压; 余各节背板具粗刻点, 点间距为点直径的0.5~1倍; 腹部第5~8节腹板及生殖节见图27。体黑色, 上颚顶端、翅基片、翅脉及翅痣、足的第2~5跗节均黑褐色。唇基、额唇基、上颚外侧、颊均被白色长毛; 胸部被稀的白毛; 腹部第1~4节背板端缘具窄的白毛带。

雌性: 未明。

观察标本: 西藏, 察雅吉塘, 3600m, 1976.VII.5, 1♂。

分布: 西藏(察雅吉塘)。




图 27 沟脊孔蜂 *H.* (s.str.) *cancavus* Wu

a. 第5腹板 b. 第6、7腹板 c. 第8腹板 d. 生殖节

(44) 小孔蜂 *Heriades* (s.str.) *parvula* Bingham, 1897

*Eeriades parvula* Bingham, 1897, Faun. Brit. Ind. Hym., 1: 508; Friese, 1911, Das Tierreich.