

毛斑；第1~6背板端缘具白毛带；腹毛刷白色。

观察标本：内蒙古，阿盟，右旗，1986. VI. 30~VII. 4, 2♂，张王玲采；乌海市，2002. V. 15, 4♀，蒙西采。

采访植物：四合木 *Tetraera mongolica* Maxim.

分布：内蒙古（阿盟、乌海）。

(56) 叶唇拟孔蜂 *Hoplitis* (*Alcidemea*) *loboclypeata* Wu, 1990 (图 37)

Hoplitis loboclypeata Wu, 1990, Entomotaxonomia, 12 (3~4): 245. China: Inner Mongolia.




图 37 叶唇拟孔蜂 *H.* (*A.*) *loboclypeata* Wu 头部前面观

雌性：8~9mm。上颚3齿；触角第1鞭节长于以下各节；2~4节等长；唇基端缘中部凸，突出部分表面光滑，余密被刻点；颊、颅顶及颜侧密被刻点；中胸宽明显大于长；盾侧沟为翅基片长的1/2；腹部背板刻点较胸部大且稀。体黑色；上颚端部、翅基片及翅脉褐色；距浅黄色。头部以灰白色毛为主；触角周围被黄色毛；胸部背板及侧板密被红褐色毛；腹部背板白毛稀而短；腹毛刷及后足跗节内表面毛均红黄色；足被白色短毛。

雄性：未明。

观察标本：内蒙古，锡林郭勒盟，兰旗，1987. VII. 13, 1♀，包单彤采；1981. VII. 3, 1♀，三卜采。

分布：内蒙古（锡林郭勒盟、兴安盟）。

(57) 北京拟孔蜂 *Hoplitis* (*Alcidemea*) *beijingensis* Wu, 1987 (图 38)

Hoplitis beijingensis Wu, 1987, Act. Ent. Sin., 30 (4): 443~444. China: Beijing.

雄性：7~8mm。体黑色。头部的触角上下扁平，第1鞭节长于第2节，第3节等于第4节长，但短于第5节之后的各节，第5~9节等长，末节较长；鞭节向端部渐加宽；单眼与复眼及侧单眼间的距离相等，短于侧单眼至颅顶的距离；唇基较长；上颚2齿；唇基刻点较颜面及颅顶刻点小而密；侧单眼外侧刻点极稀；中胸背板刻点较密，但中央较稀；并胸腹节中央小区具细皱；后足基节具刺状突起；腹部背板刻点均匀，较胸部刻点大；腹部第6节背板两侧具齿；第7节背板宽大，端部直，表面具1较浅的凹陷；第2腹板中部具横的背突；第3~4节腹板中央具不太明显的脊状隆起；第6腹板表面凹陷；第7~8腹板及生殖节见图38。触角第3鞭节至端部褐色；翅基片、翅脉及翅痣褐色；胫节距均黄色；末跗节黄褐色。唇基、颜面、颅顶及颊均被浅黄色毛；胸部