

(289) 艾切叶蜂 *Megachile appia* Nurse, 1903

*Megachile appia* Nurse, 1903, Ann. Nat. Hist., 11: 546. Kashmir; Wu, 1941, Cat. Ins. Sin., 6: 288, China.

雄性：10mm。头、胸及腹均具密、细小且浅的刻点；腹部背板收缩，顶节翘，但不具齿。黑色，距褐色，跗节毛色由前表面灰色渐向内表面变为红色；头部毛长而密；胸部及腹部第1节毛长但稀；余各背板被短毛，于端缘形成毛带；后足胫节及跗节毛短且稀。翅半透明；翅基片及翅痣黑色。

雌性：未明。

分布：中国；喀什米尔。

(290) 白冠毛切叶蜂 *Megachile albo-cristata* Smith, 1855

*Megachile albo-cristata* Smith, 1855, Cat. Zool. Coll. Brit. Mus., p. 151; Morawitz, 880, Bull. Acad. Sci. Petersb., 26: 443~518. N. W. Mongolei.

雌性：13~14mm。体黑色；颜面被黑褐色毛；颅顶毛黑色。胸及足毛均黑色；后胸两侧各具一撮白毛；翅暗褐色；后翅基部浅；中足跗节表面及所有跗节下表面、爪均黄褐色。基腹节两侧各具一撮白毛，第2~3或第4节背板两侧也各具一撮白毛，余被黑毛；腹毛刷黑色，中部黄色。

雄性：未明。

分布：内蒙古；阿尔巴尼亚。

(291) 窄条切叶蜂 *Megachile angustistrigata* Alfken, 1924

*Megachile angustistrigata* Alfken, 1924, Konowia, 3: 14; Yasumatsu, 1939, Tran. Nat. Hist. Soc. Formosa, 29: 235. N.-W. Manchuria.

雌性：7~10mm。体黑色；头及颅顶被灰毛，杂有暗色毛；颊被白毛；唇基刻点大而密，基部具窄的光滑纹，直达端部呈齿状；额唇基区闪光，具一致大的刻点；颅顶密被深刻点，两侧较大；中胸盾密被小刻点，被鳞状灰毛，中部色暗，周围被黄毛；腹部基部鳞状黄毛，末节被黑毛；腹毛刷红色，基部白色，顶节黑色。

分布：东北西北部，台湾；日本。

(292) 花切叶蜂 *Megachile anthophila* Strand, 1913

*Megachile anthophila* Strand, 1913, Supp. Ent., 2: 58~60. Formosa.

雌性：15mm。似 *M. humilis*，但唇基端缘稍凹；前翅暗色，端部超过翅长 1/2；

足黑，跗节褐，末节上表面灰黑色，下表面暗褐色；胸部及腹部第1节背板被黄红色毛；腹部第1~3背板端缘两侧具浅色毛斑，余各节毛带黄红色。头毛深黑色，仅下表面暗黄褐色；上颚基半部被灰毛；唇基密被毛，仅中央具粗刻点的光滑纹，端缘稍弯；上颚2齿；额唇基光滑，裸露，强闪光；颅顶具粗刻点；触角第2节短于第3节中胸刻点很密，几乎暗；小盾片刻点粗，皱状且暗；腹部弱闪光，具紫色光泽，每个背板端缘光滑，背板具细刻点；后基跗节基部与胫节等宽。胸部及腹部第1节背板被黄红色毛；腹毛刷黑色，基部中央浅黄色。

雄性：11.5mm。似 *M. subusta* Ckll. (= *M. rufovittata* Ckll.)，颊被金黄色毛；唇基及触角之间密被金黄色毛。腹部末节具窄而明显的中长突，中央具三角形凹，但不具齿突；腹部各背板端缘具浅色窄毛带；前足正常；后基跗节窄于胫节，长度等于以下3个跗节之和。

分布：台湾 (Suisharyo)。

#### (293) 喀什切叶蜂 *Megachile kashgarensis* Cockerell, 1913

*Megachile kashgarensis* Cockerell, Ann. Nat. Hist., 12: 371~372. Kashgar, Chinese Turkestan.

雌性：13.5mm 体红及黑色，被褐色毛；颅顶、中胸中部及小盾片被巧克力色毛。头宽于胸；触角暗；上颚具长而斜的边缘，4齿；唇基刻点粗，具光滑的中线，端缘直，具3小齿；颜面密被灰褐色毛；中胸两侧具粗刻点，中央闪光，具大而分散的刻点；小盾片刻点密；胸部无毛带；翅透明，边缘色暗；翅基片浅褐色；足黑色，被灰毛；跗节内侧毛褐色；后足基跗节宽；前足胫节被长毛伞；腹部各背板均具完整的毛带；第2~4背板被褐色毛；第5~6节被黑毛；第4节被少量黑毛；端节侧面观凹，被黑及灰色直毛；毛刷灰黄色，基部白色，顶端部分黑色毛。

雄性：未明。

分布：新疆（喀什喀尔）；中亚。

#### (294) 方斑切叶蜂 *Megachile koshunensis* Strand, 1913

*Megachile koshunensis* Strand, 1913, Supp. Ent., 2: 60. Formosa; Yasumatsu, 1939, Vol. Jubilare Prof. S. Yoshida, Osaka Japan, : 506.

雄性：18~19mm。体黑色，被黑毛；头（触角间具一白方毛斑，唇基端缘白毛）、胸中部及腹部第1节背板均被黑毛。胸部背板及端缘被红毛；翅端半部暗；基半浅烟色；翅痣及翅脉黑褐色；上颚具长脊；唇基中央几裸露，刻点皱状；头与胸等宽；中胸被密刻点；腹部刻点大，仅端缘光滑；末节具圆凹，无齿突；后基跗节只为胫节的1/2宽。