

♂, 吴燕如采; 广西, 桂林, 1952. VIII. 7, 1♀; 桂林雁山, 1955. VI. 16, 1♂; 海南, 琼中, 400m, 1960. VII. 14, 1♀, 李锁富采; 营根, 200m, 1960. V. 3, 1♀, 李常庆采; 云南, 西双版纳景洪, 650m, 1958. VII. 17, 1♀, 孟绪武采; 西双版纳勐仑, 580m, 1993. IX. 6, 1♀, 杨龙龙采; 680m, 1994. III. 31~IV. 22, 2♀, 1♂, 杨龙龙采; 大勐龙, 1994. IV. 4, 1♀, 徐环李采; 永胜禄德, 2250m, 1984. VII. 8, 3♂, 范建国采; 香港, 1932. IX. 30, 1♀。

采访植物: 大豆 [*Glycine max* (L.) Merr.]、荆条。

分布: 上海、福建(福州)、广西(桂林雁山)、海南(琼中、营根)、云南(西双版纳、永胜禄德)、香港; 缅甸。

**(207) 中亚切叶蜂伊亚种 *Megachile (Eutricharaea) dohraudti uzboica* Popov, 1936 中国新记录种**

*Megachile dohraudti uzboica* Popov, 1936, Embrik Strand, 1: 591~598.

雌性: 10mm。体黑色, 足红褐色, 腹部背板具白毛带。上颚4齿, 第2及第3间隙具浅的切脊; 唇基及额唇基闪光, 刻点较小而密; 颊为复眼宽的1/2; 颅顶刻点小而稀, 单眼间及其后光滑闪光, 极少刻点; 触角第1鞭节几等于第2鞭节的长, 第2鞭节与第3鞭节等长; 中胸背板及小盾片光滑, 边缘具很稀的细小刻点; 腹部第1~4节背板具细小刻点; 第2~4背板端半部具横沟; 第5~6节背板刻点较粗大。体黑色, 触角及翅基片深褐色; 前、中、后足的基节及转节深褐色, 腿节、胫节及跗节均红褐色; 距浅黄色; 翅透明, 翅脉及翅痣褐色。体毛白色; 唇基、颜面、颊及胸侧密被白色长毛; 中胸盾片及小盾片之间密被白色短毛; 后盾片及并胸腹节之间密被白色短毛; 并胸腹节两侧密被白色长毛; 腹部第1~5节背板端缘具白毛带; 第5~6节背板密被短白毛; 腹毛刷白色, 端节黑色; 第2~4节腹板具白色端毛带。

雄性: 10mm。与雌性主要区别为: 小盾片具细小刻点; 腹部第1节背板被白毛; 第2~4节背板端缘具白毛带; 第2~5节背板表面具白色鳞状毛, 以第5节背板最密; 第6节背板端缘具不规则的6齿, 端缘中央凹。

观察标本: 新疆: 托克逊, 1958. VI. 20, 1♀, 汪广采; 阿克苏七良溪, 1300m, 1959. VII. 22, 1♂, 田阿福采。

分布: 新疆(托克逊、阿克苏); 土库曼斯坦。

**(208) 黄带切叶蜂 *Megachile (Eutricharaea) flavofasciata* Wu, 1982 (图142)**

*Megachile flavofasciata* Wu, 1982, Insect. Xizang, 2: 403. China: Xizang.

雌性: 10.5mm。体毛灰白至浅黄色, 腹部第1~5节背板端缘具浅黄色毛带; 腹毛