

- 雄性
- 1 (6) 第 6 背板端缘具不规则的齿
- 2 (5) 第 6 背板密被白绒毛
- 3 (4) 第 6 背板端缘具不规则的齿；腹部背板黑色；10~12mm 黄足切叶蜂 *M. (P.) flavipes*
- 4 (3) 第 6 背板端具小齿，中央凹；腹部第 1~2 节背板红褐色；10~11mm 黄鳞切叶蜂 *M. (P.) derasa*
- 5 (2) 第 6 背板密被黄色绒毛；第 1~2 节腹板黄褐色；10~12mm 中国切叶蜂 *M. (P.) chinensis*
- 6 (1) 第 6 背板端缘双叶状，中央凹深
- 7 (12) 第 6 背板端缘双叶状，边缘完整
- 8 (9) 体黑色，被稀的白毛；腹部第 1~4 节背板具中断的毛带；13~14mm 双叶切叶蜂 *M. (P.) dinura*
- 9 (8) 胸部密被黄褐色毛
- 10 (11) 腹部第 1~3 节密被黄毛；第 4~5 节背板端缘具白毛带；12~13mm 柔毛切叶蜂 *M. (P.) lanata*
- 11 (10) 腹部第 1~3 节背被黄褐色长毛；第 4~6 节背板被黑色短毛；触角端节楔状；11mm 楔角切叶蜂 *M. (P.) sphenapis*
- 12 (7) 腹部第 6 节背板端缘双叶边缘具齿
- 13 (14) 腹部第 6 背板端缘齿规则；胸部被稀的黄毛；腹部背板具浅黄色毛带；9~10mm 长青切叶蜂 *M. (P.) ericetorum*
- 14 (13) 腹部第 6 背板端缘两侧具点突；胸部被白毛；腹部具白毛带；11mm 白鳞切叶蜂 *M. (P.) saussurei*

(252) 长青切叶蜂 *Megachile (Pseudomegachile) ericetorum* Lepeletier 1841

Megaachile ericetorum Lepeletier, 1841, Hist. Nat. Insect. Hymen., 2: 341; Lepeletier, 1899, Die Bienen Europa's, 5: 138~140.

Megachile fasciata Smith, 1844, Zoologist, 2: 694.

Megachile rufitarsis Smith, 1844, Zoologist, 2: 695.

Megachile pyrina Nylander, 1852, Notis. Saellsk. faun. & flo. Fenn. Forh., 2: 275.

雌性：10~11mm。体黑色，被灰黄色毛；第 2~5 节背板端缘具黄毛带。上颚 4 齿，端齿尖；颅顶及中胸被黑毛；唇基刻点较密，端缘小齿状，中央具小凹；颊明显窄于复眼；后单眼至颅顶之距等于后单眼间距等于后单眼与复眼之距；颊及颅顶刻点较唇基细密；中胸刻点细密，呈排状；腹部刻点较胸部者稀；2~3 节背板横沟深。体黑色，触角及翅基片均黑褐色；翅透明；端部较暗；翅脉及翅痣均黄褐色；距黄色。体毛黄色；唇基毛稀；颜面毛密；胸部背板四缘及侧板、并胸腹节及腹部第 1 节背板密被黄色

长毛；中胸背板中部被稀而短的黄色毛；2~5节背板被稀而短的黑毛，端缘具宽的浅黄色毛带；第6节背板被黑毛；腹毛刷狐红色，端节黑色。

雄性：11~12mm。与雌性主要区别为：前足基节具钝齿突；颜面密被黄褐色毛；胸部被黄褐色毛，不杂黑褐色毛；第6背板端缘具不规则的钝齿，中央具半圆形浅凹；第7背板端缘中央具较长的三角形突；跗节均黑褐色。

观察标本：浙江，天目山，1936.VIII. 17, 1♀, 1♂, Ma T. C. 采。

分布：浙江（天目山）；欧洲。

(253) 中国切叶蜂 *Megachile (Pseudomegachile) chinensis* Radoszkowski, 1874 (图 157)

Megachile chinensis Radoszkowski, 1874, Bull. Soc. Nat. Moscou, 48: 145; Dalla Torre, 1896, Cat. Hym., 10: 426; Friese, 1899, Bienen. Europa's., 5: 204. China; Wu, 1941, Cat. Ins. Sin., 6: 28; Wu, 1965, Econ. Ins. Faun. Sin., 9: 48.

雌性：12~13mm。体黑色，足红褐色，体毛黄褐色。头宽于长；上颚4齿，1及2齿尖，3及4齿不明显；触角第1鞭节与第2节等长，为第3节的2/3长；颊窄于复眼。体被细密刻点；唇基中央具一不明显的纵光滑纹；后基跗节较长，基部等于端部。触角柄节及第1~4鞭节红褐色，余各节上表面暗红褐，下表面红褐色，顶端两节黑色；基节及转节部分黑色；腿节、胫节、跗节、翅基片及腹部第1节背板均红褐色；翅浅黄透




图 157 中国切叶蜂 *M. (P.) chinensis* Radoszkowski

a. 第5腹板 b. 第6腹板 c. 第7背板 d. 第7腹板 e. 第8腹板
f. 生殖节