

足黑，跗节褐，末节上表面灰黑色，下表面暗褐色；胸部及腹部第1节背板被黄红色毛；腹部第1~3背板端缘两侧具浅色毛斑，余各节毛带黄红色。头毛深黑色，仅下表面暗黄褐色；上颚基半部被灰毛；唇基密被毛，仅中央具粗刻点的光滑纹，端缘稍弯；上颚2齿；额唇基光滑，裸露，强闪光；颅顶具粗刻点；触角第2节短于第3节中胸刻点很密，几乎暗；小盾片刻点粗，皱状且暗；腹部弱闪光，具紫色光泽，每个背板端缘光滑，背板具细刻点；后基跗节基部与胫节等宽。胸部及腹部第1节背板被黄红色毛；腹毛刷黑色，基部中央浅黄色。

雄性：11.5mm。似 *M. subusta* Ckll. (= *M. rufovittata* Ckll.)，颊被金黄色毛；唇基及触角之间密被金黄色毛。腹部末节具窄而明显的中长突，中央具三角形凹，但不具齿突；腹部各背板端缘具浅色窄毛带；前足正常；后基跗节窄于胫节，长度等于以下3个跗节之和。

分布：台湾 (Suisharyo)。

(293) 喀什切叶蜂 *Megachile kashgarensis* Cockerell, 1913

Megachile kashgarensis Cockerell, Ann. Nat. Hist., 12: 371~372. Kashgar, Chinese Turkestan.

雌性：13.5mm 体红及黑色，被褐色毛；颅顶、中胸中部及小盾片被巧克力色毛。头宽于胸；触角暗；上颚具长而斜的边缘，4齿；唇基刻点粗，具光滑的中线，端缘直，具3小齿；颜面密被灰褐色毛；中胸两侧具粗刻点，中央闪光，具大而分散的刻点；小盾片刻点密；胸部无毛带；翅透明，边缘色暗；翅基片浅褐色；足黑色，被灰毛；跗节内侧毛褐色；后足基跗节宽；前足胫节被长毛伞；腹部各背板均具完整的毛带；第2~4背板被褐色毛；第5~6节被黑毛；第4节被少量黑毛；端节侧面观凹，被黑及灰色直毛；毛刷灰黄色，基部白色，顶端部分黑色毛。

雄性：未明。

分布：新疆（喀什喀尔）；中亚。

(294) 方斑切叶蜂 *Megachile koshunensis* Strand, 1913

Megachile koshunensis Strand, 1913, Supp. Ent., 2: 60. Formosa; Yasumatsu, 1939, Vol. Jubilare Prof. S. Yoshida, Osaka Japan, : 506.

雄性：18~19mm。体黑色，被黑毛；头（触角间具一白方毛斑，唇基端缘白毛）、胸中部及腹部第1节背板均被黑毛。胸部背板及端缘被红毛；翅端半部暗；基半浅烟色；翅痣及翅脉黑褐色；上颚具长脊；唇基中央几裸露，刻点皱状；头与胸等宽；中胸被密刻点；腹部刻点大，仅端缘光滑；末节具圆凹，无齿突；后基跗节只为胫节的1/2宽。