

张学忠采；芒康海通，3250m，1982.VII.8，1♂，王书永采。

分布：甘肃（张掖、兰州）、青海（祁连）、四川（巴塘）、西藏（扎达、芒康）。

(241) 冒切叶蜂 *Megachile (Xanthosaurus) maackii* Radoszkowski, 1874 中国新记录种

Megachile Maackii Radoszkowski, 1874, Bull. Soc. Nat. Mosc., 67: 135, S. O. Mongolia; Morawitz, 1880, Bull. Acad. Sci. Petersb., 26: 443 ~ 518; Friese, 1911, Das Tierreich, Megachilidae, 224, Petersburg-Irkutsk.

雌性：15mm。体黑色，被灰毛；胸部表面被褐色毛；腹部第1~2节被灰毛，端缘具毛带；腹毛刷红色。

雄性：12mm。腹部第6节背板中央凹；第7节背板具3齿；前足黄褐色具黑斑；胫节宽，白色，边缘被毛；触角端节扁。

观察标本：未见标本。

分布：内蒙古；蒙古，俄罗斯（西伯利亚）。

(242) 海切叶蜂北方亚种 *Megachile (Xanthosaurus) maritima manchurica* Hedicke, 1940

Megachile maritima Kirby ssp. *manchurica* Hedicke, 1940, Stizung. Ges. nat. Fre., 11: 341. Manchuria.

雌性：17~18mm。体黑色，被黄褐色毛。胸部下表面毛灰白色，上表面浅黄色毛。上颚4齿，表面具长沟；唇基具皱及刻点；中胸盾片具大刻点；后足基跗节宽扁，基部宽于端部；腹部第2~4节背板端缘具明显的白毛带；末节背板被白毛；腹毛刷第2~4节浅黄色，第5节黄褐色，第6节黑褐色。

雄性：15~17mm。触角鞭节深褐色，末节宽扁；上颚宽，亚端部外侧黄褐色；前足基节具针突；前足腿节及胫节粗，近三角形；腿节下表面及前足胫节端部红褐色；胫节具两个齿限定的深凹；前足胫节端部1/3及宽扁的跗节均浅黄色，外缘密被白长毛，毛端黑色；基跗节前缘被黑毛，第2跗节下表面具暗斑；后足腿节及胫节粗短；跗节弯曲；第6背板端缘不规则的波状，无中凹。

观察标本：北京，1♀，1♂，1936.VII.13~IX.1，2♀，1♂，1962.VII.6，1♀，王书永采，1962.VII.11，1♀，1989.VII.6，1♀，1♂，徐环李采；河北，Yangkiaping, 1937.VII.20, 1♀；小五台, 1240m, 1964.VII.8, 29, 1♀，毛金龙采，1♀，王春光采，1200m, 1964.VII.8, 1♂，韩寅恒采；蔚县白乐, 920m, 1964.IX.1, 1♀，王春光采；山西，太谷，1953.VII.1, 2♀，杨长佐采；内蒙古，敖汉旗，1990.VII.6~31, 24♀，徐环李采；锡盟，1980.VII.25~31, 5♀, 2♂，王淑芳采；清水河，1998.VII.9~29, 29♀, 9♂，徐环李采；兴安盟前旗，1983.VII.29, 1♂；吉林，长白山，1981.VII.