



图 177 丝切叶蜂 *M. (Cr.) sericans* Fonscol

(仿 Popov, 1953)

a. 第6腹板 b. 第8腹板 c. 生殖节

分布：新疆（裕民、巴里坤、石河子、焉耆）；中亚，欧洲，北非。

(286) 达戈切叶蜂 *Megachile (Creightonella) takoensis* Cockerell, 1911

①达戈切叶蜂指名亚种 *Megachile (Creightonella) takoensis* Cockerell, 1911 (图 178)

*Megachile takoensis* Cockerell, 1911, Ann. Mag. Nat. Hist., 8 (7): 317~318. Formosa.

*Megachile takaoensis* Cockerell, 1927, Amer. Mus. Nov., 274: 8. Formosa. (see Pan-Pacific Ent., 1926, 3: 86.); Cockerell, 1931, Amer. Mus. Nov., 480: 3 Formosa, Foochow; Wu, 1965, Yunnan Bee Fauna, : 49; Wu, 1992, Insect. Hengduan Mt. Reg., 2: 1389.

雌性：17~18mm。体黑色，腹部背板被黄褐色毛。头明显宽于长；上颚宽，4钝齿，基部具疣突；唇基宽，端缘直，具不明显的小突起，表面刻点粗且稀；额两侧刻点粗且稀；单眼周围及额唇基区刻点较细小；颅顶端缘较凹；颊为复眼宽的1/2；颅顶端缘及中胸背板刻点细且密；后基跗节稍宽；腹部各节背板刻点细小且密。上颚被稀的金黄色毛；唇基密被金黄色毛；触角周围密被雪白色长毛；胸部被稀的橘黄色短毛；小盾