

雄性：12mm。体窄长，体毛似雌性；上颚4齿，齿尖，第2齿小于其他齿；触角长，黑色；前足基节具短针突；胫节及跗节简单。腹部第6背板收缩，表面刻点颗粒状，中央被黄绒毛，端缘宽向上翘，非边缘均具齿。腹部背板具完整的红毛带，沟内被红毛；颜面密被红毛；颅顶及中胸中央被黑毛；第6背板亚端缘无齿。

分布：台湾；日本。

(298) 绒毛切叶蜂 *Megachile vestita* Smith, 1853

Megachile vestita Smith, 1853, Cat. Hym. Brit. Mus., 1: 176~177. India; Smith, 1897, Faun. Brit. Ind. Hym., 1: 485; Friese, 1911, Tierreich, Megachilidae, 1: 309; Matsumura & Uchida, 1926, Ins. Matsumura I (2): 63., Formosa

雌性：13~14mm。黑色。颜面密被鲜黄色毛；上颚短且钝，3齿，具纵沟，基部被鲜黄色纤毛；颊密被灰褐色毛；胸部中央及侧板密被鲜黄色毛，侧板下半部毛白色；足密被浅黄色毛；跗节下表面黄色；距褐色；爪锈色，顶端黑色；翅半透明。腹部宽短，顶端尖，各节背板基部、两侧及端缘均被浅黄色毛；腹毛刷中部浅黄色，侧鲜黄色。

雄性：未明。

分布：台湾；印度。