

Type species: *Trichiura khasiana* Moore, 1879, by original designation.

本属与 *Trichiura* 属相似，脉序与之相同（图 247），但前胫突短，雄性外生殖器结构明显不同：爪形突和颚形突缺；背兜侧突靠近背面；抱足杯状；抱器瓣短。




图 247 温枯叶蛾属 *Baodera* Zolotuhin 的脉序

本属仅包含模式种，分布在喜马拉雅地区，我国也有记录。

(219) 三纹温枯叶蛾 *Baodera khasiana* (Moore, 1879) (图 248, 图版Ⅷ: 219)

Trichiura khasiana Moore, 1879. *Descr. new Ind. Insects colln Atkinson* 1: 82.

Baodera khasiana (Moore): Zolotuhin, 1992. *Atalanta* 23 (3/4): 491.

Trichiura sanzwenensis Hou et Wang, 1992, *Entomotaxonomia* 14 (4): 272—276.

雄蛾 体长 17—18mm，翅展 39—40mm。

体翅黑黄褐色，前胸呈深黄色斑纹，中、后胸散生深黄褐色鳞毛。前翅中室端斑点模糊，黄褐色翅脉明显。中、外横线，亚外缘斑列呈 3 条浅黄色弧形平行线，外缘毛褐色与黄色毛相间。后翅浅褐色，正、反面的中间均呈深褐色横带。前足胫突呈棒状。腹部第 8 腹板后缘凹陷。

雄性外生殖器 背兜侧突指状，强骨化；抱器瓣分为 2 叶：大抱针指状（上叶），下叶末端有小齿突；抱囊球状，密生刚毛；阳茎短剑状，阳茎端膜内有许多针状的刺突。

观察标本 云南镇源（23.9°N, 100.9°E, 2750m），1 ♂，1984. Ⅷ. 15，沈陈




图 248 三纹温枯叶蛾 *Baodera khasiana* (Moore)
a. 雄性外生殖器; b. 阴茎

人采。

分布 云南（镇源）；印度，不丹，尼泊尔，缅甸。