

分布 广西（金秀）。

本新亚种与产自越南北部的指名亚种的区别在于第8腹板前缘的中臂很长，而与云南亚种云斑枯叶蛾的区别在于第8腹板前缘的中臂末端单齿状，前翅颜色偏红，中室端白斑不明显。

(32) 美斑枯叶蛾 *Cosmeptera pulchra* Lajonquiere, 1979 (图 44)

Cosmeptera pulchra Lajonquiere, 1979, *Bull. Soc. ent. Fr.* 84: 13.

翅展 29 mm。触角黄褐色。下唇须端部褐色。头部和胸部褐色，腹部颜色较深。前翅黄褐色；内线和外线经常模糊，褐色到深褐色；亚端线较细而清晰；中室端的浅白色斑几乎完全消失；缘毛与翅同色。后翅颜色较前翅稍深，无斑纹。




图 44 美斑枯叶蛾 *Cosmeptera pulchra* Lajonquiere
(仿 Lajonquiere, 1979)

a. 前胫突; b. 雄性外生殖器; c. 阳茎; d. 雄第8腹板

雄性外生殖器 第8腹板略呈梯形；背兜窄，带状；背兜侧突长条状，中等骨化；抱器瓣上叶剑状；抱器瓣下叶基部宽大，端部尖齿状；抱足片形，有1对足状的突起；阳茎细长，弓形，末端尖，基部1/4处有1枚较大的侧突。

观察标本 模式标本（4 ♂♂，1935.VII.8—25，5 ♂♂，1936.VII.23—28）采自陕西太白山，分别保存在德国波恩和大英博物馆，我们没有采到标本。

分布 陕西（太白山）。