

生活习性 9月上旬出现成虫。

观察标本 陕西宁陕火地塘1♂, 1964.IX.11。

分布 福建(崇安)、陕西(宁陕)。

(95) 阿里山松毛虫 *Dendrolimus arizana* (Wileman, 1910) (图111)

Metanastria arizana Wileman, 1910, *Entomologist*, 43: 192.

Dendrolimus arizana Wileman: Lajonquiere 1979, *Bull. Soc. Ent. Fr.* 84: 184—201.

翅展 雄蛾54mm左右；雌蛾92mm左右。

雄蛾体翅红褐色，前翅中室端白点明显，中、外横线暗褐色，中横线模糊，外线齿状呈弧形弯曲，其外侧衬以白色线条，亚外缘斑列呈长圆形黑褐色斑点，较稀疏，最后两斑大而明显，其内侧具两个明显的灰色大斑，外缘与斑列间(外缘区)呈暗红褐色，中间向内呈角状突出达外缘，后翅浅红褐色，中间呈明显的暗色弧形中带。雌蛾体色较深，仅在前翅外缘和翅基部分色泽稍淡。

雄性外生殖器 阳茎尖角状，较短小、表面无小刺，大抱针曲指状，抱囊方圆形、

图111 阿里山松毛虫 *Dendrolimus arizana* (Wileman) (仿 Lajonquiere, 1979)

a. 雄性外生殖器；b. 阳茎

疏生刚毛，背兜侧突位于大抱针上部，疏生长刚毛，抱足端部折曲。

生活习性 9月份出现成虫。

观察标本 作者未见标本。

分布 台湾。

(96) 花缘松毛虫 *Dendrolimus taiwanus* (Matsumura, 1932) (图112)

Karenkonia taiwanus Matsumura, 1932, *Insecta matsum.* 7: 45.

Dendrolimus taiwanus (Matsumura): Kishida, 1985, *Japan Heteroc. J.* 132: 99.

Dendrolimus inouei Lajonquiere, 1979, *Bull. Soc. Ent. Fr.* 84: 187.

雄蛾翅展53mm左右。触角梗节浅黄色，羽枝灰黑色。头、胸栗褐色，体翅褐色。前翅中、外横线深褐色，中室端白点明显，白点至翅基呈浅色圆斑纹，外横线锯齿状，前端大而明，外侧衬以深色斑纹，略似双重，亚外缘斑列黑褐色，上半部呈明显的齿状，5—6斑大而显著，向内侧突出达外线，最后两斑相连成一大斑，外缘毛深褐色和