

体翅淡赤褐色，略带红色，下唇须黑褐色向前突出，触角黄褐色或灰褐色。前翅不规则地散布黑色小点，翅脉黄褐色较明显，前缘 $2/5$ 处呈弧形弯曲，外缘较长，略呈弧形，后缘较短，中室端黑点明显，顶角区呈两枚模糊的大黑点。后翅较狭长，后缘区淡黄褐色，肩角突出，前半部由4枚花瓣形组成一圆斑。雄蛾淡黄褐色，前两瓣具有两枚明显的黑点。雌蛾圆斑隐现。

**雄性外生殖器** 背兜侧突细长，末端尖；抱器瓣背突宽短；抱器瓣腹突短宽，约为抱器瓣长度的 $2/5$ ，端部明显比基部细，边缘锯齿状；阳茎管状，较短，阳茎端膜内有1组粗针状突和1组细针状突。本亚种抱器瓣腹突上的刺突比指名亚种更明显；阳茎端部的角状器数量更多。

**生活习性** 每年6月和9月出现成虫。

**观察标本** 四川西昌泸山1700m，1♀，1980.VII.30；都江堰1♀，1965.IX.27；峨眉山3♀♀，1976.VII；合川1♀，1979.IX.14；重庆南山1♀，1966.V.4。广东广州2♂♂，1958.IX.19。广西博白林场60m，2♀♀，1983.X.7。湖南张家界2♀♀，1988.X.8；索溪峪三所400m，1♀，1988.X.17。湖北巴东1♀，1989.V.19。海南尖峰岭1♀，1982.I.20。福建福州2♀♀，1974.IV.12；福州魁岐1♀，1962.VI；南平福建林学院1♀，1980.IV.11；西芹1♀，1977.VI.5，1♂，1978.IX.23；沙县洋坊2♀♀，1982.IV.6。江西南昌1♂，无日期。

**寄主植物** 柑橘。

**分布** 浙江、福建、江西、湖南、湖北、广东、广西、海南、四川、云南。

#### (134) 台橘褐枯叶蛾 *Gastropacha pardale formosana* Tams, 1935

*Gastropacha pardale formosana* Tams, 1935, *Mem. Musee Royal de Belg.*, *Hors Serie*, 4 (12): 51.

体型较大陆亚种 *Gastropacha pardale sinensis* Tams 稍大，翅面的暗褐色鳞片较多。雄性外生殖器的抱器瓣腹突基部较宽，更弯曲一些；阳茎端部的角状器数量较少。

**分布** 台湾。

#### (135) 石梓褐枯叶蛾 *Gastropacha philippinensis swanni* Tams, 1935 (图153, 图版V: 135a, 135b)

*Gastropacha pardale swanni* Tams, 1935, *Memoires du Musee Royal d'Histore Naturelle de Beigique*, *Hors, Serie*, IV: 52.

*Gastropacha philippinensis swanni* Tams: Lajonquiere, 1977, *Bull. Soc. Ent. Fr.* 82: 142.

**别名** 石梓毛虫。

**翅展** 雄蛾43—50mm，雌蛾48—56mm。

体淡黄褐色，触角黄褐色、褐色。前翅翅面暗黄褐色到暗褐色呈稀少的黑色小点，