

期 1♂。

分布 新疆；外高加索，俄罗斯，乌拉尔河南部，哈萨克斯坦，中亚，巴尔干，土耳其，伊朗，伊拉克，阿富汗。

侯陶谦（2001）在《福建昆虫志》第5卷中报道该种 [*Lasiocampa sordidior* (nec. Rothschild)] 分布在福建（无小地名），我们没有发现标本。从该种的分布情况来看，其分布在福建的可能性不大。

(159) 三叶枯叶蛾 *Lasiocampa trifolii* (Denis et Schiffermüller, 1775) (图 179, 图版 VI: 159)

Bombyx trifolii Denis et Schiffermüller, 1775. *Ankündigung syst. Werkes Schmett. Wienergegend*: 57.




图 179 三叶枯叶蛾 *Lasiocampa trifolii* (Denis et Schiffermüller)

a. 雄性外生殖器；b. 阴茎

雄蛾翅展 42—45mm。触角干灰白色，羽枝长而密，灰褐色。雄蛾前翅暗黄褐色；中室端斑灰白色，较大；外线灰黄色，弧形，较细。后翅颜色稍淡，无斑纹。

雄性外生殖器 背兜中等骨化，较宽，带状；背兜侧突不明显；抱器瓣上叶骨化，指状，较长；下叶骨化程度弱，椭圆形，顶角短指状突出；抱足舌状，中部两侧呈指状突出；阴茎细长，几乎直，末端向一侧减削。

寄主植物 蒿属 *Artemisia*、独行菜属 *Lepidium*、栎属 *Quercus*、锦鸡儿属 *Caragana*、金雀儿属 *Cytisus*、苹果属 *Malus*、岩黄耆属 *Hedysarum*。

生活习性 成虫 8—9 月份出现，以卵越冬。

观察标本 新疆塔城农科所 2♂♂，1979.VIII，符振声采。

分布 新疆；白俄罗斯，乌克兰，摩尔达维亚，克里木，俄罗斯，高加索，外高加索，中亚，哈萨克斯坦，西伯利亚，西欧，北非，土耳其。

本种在其分布范围内的颜色极其多变，从深红褐色到浅黄灰色。

21. 袋枯叶蛾属 *Macrothylacia* Rambur, 1866

Macrothylacia Rambur, 1866. *Cat. Syst. Lepid. Andalousie* (2): 358.

Type species: *Phalaena rubi* Linnaeus, 1758, by original designation.

眼具毛。下唇须末节较短，可与枯叶蛾属 *Lasiocampa* 相区别。雄蛾触角的分枝长，雌蛾则分枝很短，几乎呈线形。翅阔圆，前翅有 2 条浅色的横线。后翅 6 脉和 7 脉总是有明显的共柄；基部的小副室较小，只达中室的中部，由其分出 2 条（简单或分岔）强的副脉伸达翅的前缘（图 180）。

本属只包括模式种，在古北界广泛分布。我国也有记录。




图 180 袋枯叶蛾属 *Macrothylacia* Rambur 的脉序

(160) 灰袋枯叶蛾 *Macrothylacia rubi* (Linnaeus, 1758) (图 181, 图版 VI: 160)

Phalaena rubi Linnaeus, 1758. *Syst. Nat.* (edn 10) 1: 498.

Macrothylacia rubi (L.): Rambur, 1866. *Cat. Syst. Lepid. Andalousie* (2): 358.

雌蛾翅展 60mm 左右。身体灰褐色，被灰白色毛。前翅淡灰黄色，基部内线以内