




图 194 浅双带幕枯叶蛾 *Malacosoma castrense kirghisica* (Staudinger)

a. 雄性外生殖器; b. 阳茎; c. 第8腹板; d. 雌性外生殖器

寄主植物 杨树、蒿属 *Artemisia*、老鹳草属 *Geranium*、大戟属 *Euphorbia*。

观察标本 新疆石河子 2 ♂♂, 无日期; 乌鲁木齐 2 ♂♂, 1974. V.27; 塔城沙湾县 1 ♂, 1976. V。甘肃敦煌 3 ♀♀, 1978. VII.。

分布 甘肃 (敦煌)、新疆 (沙湾县、乌鲁木齐、石河子); 哈萨克斯坦, 土库曼, 乌兹别克斯坦。

(174) 青春幕枯叶蛾 *Malacosoma prima* (Staudinger, 1887)

Bombyx alpicola var. *prima* Staudinger, 1887, *Stett. ent. Ztg.* 48 (1—3): 97—98.

Malacosoma alpicola f. *cinnamomea* Grünberg, 1911, in Seitz, *Gross-Schmett. Erde* 2: 179.

Clisiocampa vulpes Hampson, 1900, *J. Bombay nat. Hist. Soc.* 13: 233, pl. B.

雄蛾栗褐色。前翅中带较宽, 其内缘锯齿状, 外缘直, 带2侧衬黄白色的宽边; 缘毛间有黄白色。后翅有1条模糊的浅色中带。雌蛾颜色较浅, 2翅均有模糊的浅色横带。

寄主植物 蓼属 *Polygonum* (蓼科)。

生活习性 成虫6—7月份出现, 以幼虫在卵壳内越冬。

观察标本 作者未见标本。

分布 新疆; 中亚的山区。

(175) 山地幕枯叶蛾 *Malacosoma parallela* (Staudinger, 1887) (图 195, 图版Ⅶ: 175)

Bombyx neustria parallela Staudinger, 1887, *Stett. Ent. Zeit.*, Jahrg. 48: 98.