

(104) 褐榆枯叶蛾 *Phyllodesma ursulae* Zolotuhin et Witt, 2004 (图 119, 图版 IV: 104)

Phyllodesma ursulae Zolotuhin et Witt, 2004. *Tinea*, 18 (1): 39.




图 119 褐榆枯叶蛾 *Phyllodesma ursulae* Zolotuhin et Witt

a. 雄性外生殖器; b. 阴茎; c. 前胫突

雄蛾翅展 33—35mm。前翅暗赭灰色，基部色较浅，端部有许多灰白色的鳞片；内线模糊，稍内凹，暗灰色；外线几乎直，有时微波状，很细，暗灰色，外侧衬灰白色鳞片；中室端斑细长，浅黑色。后翅有 1 条暗灰褐色的横带。

雄性外生殖器 背兜骨化程度弱，阔；背兜侧突大而密生长毛；基腹弧带状；抱器瓣阔，叶片形，其端缘有不规则的锯齿，而大多数锯齿又呈双齿状；阴茎短阔，有 1 短的短刺突；阴茎端膜内有 2 组针状刺突。

观察标本 陕西秦岭 1 ♂，197? . V. 12，西北农学院。

分布 陕西（秦岭）。

模式标本 (16 ♂♂) 1999 年 4—5 月采自陕西佛坪自然保护区，保存在德国慕尼黑 Witt 博物馆 (MWM)。

14. 翅枯叶蛾属 *Eteinopla* Lajonquiere, 1979

Eteinopla Lajonquiere, 1979, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 84: 16.

Type-species: *Odonestis signata* Moore, 1879, in Hewitson et Moore, *Descr. new Indian Lepid. Insects Colln late Mr. W. S. Atkinson* (1): 76, by original designation. Type-locality: India : Dajeeling.