

雄性外生殖器 整体上比模式种小许多，抱器瓣上叶短而直；阳茎端部的突起粗短。

观察标本 模式标本采自台湾南投县，保存在日本国立科学博物馆，作者未见标本。

分布 台湾。

(209) 云拟痕枯叶蛾 *Syrastrénopsis imperiatus* Zolotuhin, 2001 (图 237c)

Syrastrénopsis imperiatus Zolotuhin, 2001. *Atalanta*, 32 (3/4): 467.




图 237 拟痕枯叶蛾属 *Syrastrénopsis* 各种的雌性外生殖器及前胫节距 (仿 Zolotuhin, 2001)

- a. 拟痕枯叶蛾 *S. moltrechti* Grunberg;
- b. 台拟痕枯叶蛾 *S. kawabei* Kishida;
- c. 云拟痕枯叶蛾 *S. imperiatus* Zolotuhin

雌蛾翅展 43mm。前翅红褐色，内、外横线暗灰色，其内侧不衬浅白色的鳞片；亚端线浅灰色；缘毛暗褐色。后翅有 2 条模糊的暗色横带。

雌性外生殖器 产卵瓣短，密被短鬃；前阴片强骨化，阔，接近长方形，后缘中部有 1 个半圆形的凹陷；后阴片端缘有明显的缺刻，侧面有众多的褶皱；交配孔阔，膜质；导管端片和囊导管不明显；交配囊袋状，短，膜质，无囊突。

观察标本 本种只有正模标本 (♀)，云南德钦阿敦子 4500m, 1937. VIII.20, Höne 采，存大英博物馆 (BMNH)。

分布 云南 (德钦)。