

7 个; 汶川映秀, 1000m, 1983.IX.15-17, 4 个)、贵州(江口, 550-850m, 1988.VI.28-VII.16, 2 个)、云南(孔明山, 1957.IX.21, 1 个; 西双版纳, 870-1080m, 1957.V.26-X.23, 11 个, 620-650m, 1958.VII.22-IX.15, 23 个, 580m, 1959.VII.13, 1 个, 1993.IX.6, 3 个)、陕西(留坝, 1470m, 1999.VII.1, 1 个; 宁陕, 1580-2000m, 1998.VII.27-VIII.18, 3 个)、甘肃(文县, 1450-1500m, 1998.VI.25-1999.VII.28, 2 个; 康县, 1020-1400m, 1998.VII.14-1999.VII.10, 4 个)。

分布 河北、内蒙古、江苏、浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东(连县)、广西、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、台湾; 整个东洋区, 非洲区, 澳洲区。

(75) 东方狭口食蚜蝇 *Asarkina orientalis* (Bezzi, 1908)

Asaricina orientalis Bezzi, 1908: 498.

Asarkina orientalis (Bezzi, 1908): Knutson *et al.*, 1975: 310; Peck, 1988: 13; Huang *et al.* 1996: 135.

体长 10-11mm。

与 *A. ericetorum* 很接近, 曾作为它的一个变种。

雄性 头顶黑色; 额黑色, 前端光亮, 具蓝和紫色光泽, 两侧覆黄色粉被, 额毛黑色; 颜黄色, 两侧覆银白色粉被和黄白色毛; 雄性颊黄色。触角基部两节黄色, 第 3 节上侧及端部黑褐色。中胸背板黑色, 具光泽, 两侧黄色, 背板密被黄毛; 小盾片黄色, 毛黑色; 侧板黄色, 密被黄长毛; 腹侧片下部及中侧片前缘黑色。腹部黄色, 具宽的黑色横带; 第 1 节后缘黑色狭; 第 2 节具明显的黑色中条, 第 2-5 节具宽的黑色横带, 该横带约占背板 1/3 长, 直达侧缘且不变狭。足黄色, 各足跗节背面黑褐色; 足毛黄色, 仅后足腿节端部、胫节及跗节被黑毛。翅略呈黄褐色, 透明, 翅痣黄褐色。

雌性 头顶黑色具紫色光泽; 颊黑色; 后头覆黄白色毛和粉被。腹部第 2-5 节前缘具窄的黑色横带。

共检查 11 号标本:

海南(1934.X.28, 1 个)、云南(西双版纳: 1993.IX.16, 2 个; 勐遮, 870-1200m, 1958.VIII.28-IX.2-8, 4 个; 大勐龙, 650m, 1957.V.10, 1 个, 1958.IV.13, 1 个; 小勐养, 1957.IX.2, 1 个; 河口, 800m, 1956.VI.12, 1 个)。

分布 海南、云南; 马来西亚, 菲律宾。

(76) 黄腹狭口食蚜蝇 *Asarkina porcina* (Coquillett, 1898) (图 57, 图版 II: 7)

Syrphus porcina Coquillett, 1898: 322.

Asarkina porcina (Coquillett, 1898): Sun, 1987: 1182; Peck, 1988: 13; Knutson *et al.*, 1975: 310; He, 1992: 1135; Huang, 1992: 1135; Huang *et al.*, 1996: 135.