

四川、云南、西藏、新疆、台湾；原苏联(远东)，朝鲜，日本；东南亚。

我国有记载而未见标本的种类：

### (5) 短额巴蚜蝇 *Baccha elongata* (Fabricius, 1775)

*Syrphus elongata* Fabricius, 1775: 768.

*Baccha elongata* (Fabricius, 1775): Peck, 1988: 54; Li & Li, 1990: 38; Huang *et al.*, 1996: 121.

体长 8.5-9mm，翅长 6-7mm。

**雄性** 头顶黑色，被棕黄色毛；额亮黑色，被同色毛；颜黑色，具蓝色光泽，覆白色粉被，前半部被白色短毛，后半部被黑色长毛，中突裸。复眼裸，接缝长度大于额长。触角黑色。中胸背板亮黑色，被淡色短毛；肩胛裸，小盾片同背板，无盾下毛；侧板黑色，有很强的铜色光泽。腹部背板大部亮黑色；第 3-4 节基部 1/3 为黄色横带，其后缘中央具深缺刻；第 5 节黑色。背板被毛短，主要黑色，第 2 节全部、第 3 节基半部两侧及黄斑被毛白色。足大部分棕色，基节、转节黑色；前、中足胫节黄色，其中部具模糊黑斑；后足跗节近黑色。翅略呈烟色，翅痣棕黄，内端黑色。腋瓣甚小，平衡棒头部淡黑色。

**雌性** 头顶亮黑色，被黑色毛；额两侧具狭长的白色粉被纹，但中线及触角上方裸，额毛短，白色；颜在中突两侧呈棕黄色。肩胛覆浓密的黄色粉被；中胸前侧片后部棕黄色。腹部第 5 节基部两侧各有 1 块小黄斑。后足跗节黑色(摘自 Li and Li, 1990)。

**分布** 甘肃(天祝)。

## (二) 长角蚜蝇族 *Chrysotoxini*

**族征** 触角前伸，长于头，第 3 节至少 3 倍长于宽，或基部 2 节细长；腹部背面明显凸起，边明显。

此族仅包括 1 个属。

### 3. 长角蚜蝇属 *Chrysotoxum* Meigen, 1803

*Chrysotoxum* Meigen, 1803: 275. Type species: *Musca bicincta* Linnaeus, 1758 (des. Latreille, 1910: 443).

*Antiopa* Meigen, 1800: 32. Type species: *Musca bicincta* Linnaeus, 1758 (des. Coquillett, 1910: 508).

**属征** 体中至大型，黑色，具亮丽的黄色带和斑。头半球形，与胸等宽；额突出；