

(224) 浙江突角蚜蝇 *Ceriana chekiangensis* (Ôuchi, 1943) (图 162)

*Tenthredomyia chekiangensis* Ôuchi, 1943: 20.

*Ceriana chekiangensis* (Ôuchi, 1943): Huang, Cheng *et* Yang, 1996: 162.

体长 12-15mm。

**雄性** 头顶及额黑色，额在触角基部两侧与复眼之间具椭圆形小黄斑，额突黑色；颜黄色，触角基部下方及颜下部两侧黑色；颊黑色；后头黑色。触角黑色；触角第3节覆褐色粉被。中胸背板黑色，仅肩胛具小黄斑；侧板及小盾片全黑色。腹部黑色，基部不收缩；第1节基角及侧缘黄色，有时黄色部分延伸至第2节侧缘，但不明显；第2-4节后缘具黄横带，第2节横带宽，明显。足黑褐色，腿节末端、胫节基部及基跗节黄褐色。翅前半部黑褐色，有时具紫色光泽。

**雌性** 颜仅中部黄色，上下黑色部分较宽，有时黄斑正中被黑色隔开为1对黄斑。

共检查 20 号标本：

浙江(西天目山, 1937.VII.13, 3 个)；安徽(1920.VII.23-VII.20, 3 个)、江西(牯岭, 1935.II.22, 6 个)、四川(峨眉山, 1955.VI.7, 1 个)；峨眉山报国寺, 550-750m, 1957.VI.5, 3 个)、云南(小勐养, 810m, 1937.III.31, 1 个)、甘肃(1920.VII.20-23, 3 个)。

**分布** 江苏、浙江、安徽、江西、四川、云南、甘肃。




图 162 浙江突角蚜蝇 *Ceriana chekiangensis* (Ôuchi) ♂  
整体 (wholly)