

节基半部和顶端 1/4、跗节基部和胫节间红褐色。(摘译自 Shiraki, 1930)

分布 台湾。

(335) 橘毛黑蚜蝇 *Cheilosia ochreipila* (Shiraki, 1930) (图 265)

Chilosia *ochreipila* Shiraki, 1930: 283-284; Knutson *et al.*, 1975: 330.

Cheilosia (s. str.) *ochreipila* (Shiraki, 1930): Barkalov *et* Cheng, 2004: 332-333.

体长 11-13mm。




图 265 橘毛黑蚜蝇 *Cheilosia ochreipila* (Shiraki) (仿 Shiraki, 1930)

a. 头 (侧面观 ♀) (head of female in lateral view ♀) b. 头 (侧面观 ♂) (same of male ♂)

雄性 头顶狭小，微拱起；额暗青铜色，多刻点，具 1 宽纵凹，被黑色长毛，粉被不明显；颜狭，暗黑色，很光亮，具蓝色光泽，在触角基部下面覆黄色粉被，毛深黑色，长而稀，上部毛褐色；眼缘狭，覆黄色粉被和亮黄色短毛。复眼被黑色长毛。触角黑色，第 3 节红色或黄褐色，第 3 节长与宽几乎相等，端缘宽圆；芒几乎与触角等长，黑色，基部黄色，被明显短毛。中胸背板亮青铜色，密被黄褐色长毛，混杂许多不长的黑色毛，无鬃；小盾片具大刻点，颜色和被毛似背板，但毛明显长于背板，盾下缘缨密，金黄色；侧板亮青铜色，略覆褐色粉被，毛金黄色到亮黄褐色。腹部青铜色，具紫色光泽，毛长而密，红黄色到黄褐色。翅较长，褐色，基部微黄色。平衡棒黄褐色；腋瓣暗灰色，边缘暗褐色，缘毛长，黄褐色。足红黄色，基节、转节和腿节基半部及跗节端节黑色；毛

黄色，腿节外侧毛特别长，胫节被许多黑色长毛，后足腿节下缘具许多黑色短髯。

雌性 额覆 2 个很小的黄色粉被侧斑。中胸背板略呈绿色，被黄褐色或黄色短毛；侧板被黄褐色短毛。腹部被亮黄色至橙黄色短毛。足不被黑色毛，转节黄褐色，腿节基部 1/3 黑色。(摘译自 Shiraki, 1930)

分布 台湾。

(336) 拉古黑蚜蝇 *Cheilisia rakurakuensis* (Shiraki, 1930) (图 266)

Chilosia *rakurakuensis* Shiraki, 1930: 265-267; Knutson *et al.*, 1975: 330.

Cheilisia (?*Cheilisia*) *rakurakuensis* (Shiraki, 1930): Barkalov *et Cheng*, 2004: 342.

体长 7.5-9mm。

雄性 头顶黑褐色，很光亮；额毛较长；颜两侧平行，亮蓝黑色，被褐色粉被，中突顶端和口缘突裸。复眼被黑褐色短毛，两眼连接线长。触角暗黄褐色，第 3 节长略大于宽，近顶端黑色，长于基部两节之和，上缘几乎直，下缘具一切口，端缘略呈截状；芒长于触角，黑色，被明显的短毛。背板亮青铜色，被黄褐长毛，混杂许多黑色毛，基部明显；两侧髯毛明显，具 6 枚明显的黑髯；小盾片中等大小，颜色和毛似背板，毛略长些；后缘约有 12 枚很长的髯，该髯近侧面逐渐变短；侧板绿黑色，被亮黄色短毛。腹部近乎黑色，略具青铜色光泽，被橙黄色短毛，混杂一些黑色粗毛。胫节整个黄色，黑色环不明显。翅明显短于体长。(摘自 Shiraki, 1930)




图 266 拉古黑蚜蝇 *Cheilisia rakurakuensis* (Shiraki) (仿 Shiraki, 1930)

a. 头 (侧面观 ♂) (head of male in lateral view) b. 头 (前面观 ♀) (head of female in frontal view) c. 头 (侧面观 ♀) (same in lateral view) d. 触角 ♀ (antenna of female) e. 触角 ♂ (same of male)