

1-3 节具三角状闪亮斑点, 第 4 节整个具蓝色光泽, 被黄色直立毛稀, 第 1-3 节两侧毛明显长。足腿节黑色, 顶端黄色; 胫节黄色, 后足胫节具细的褐色环; 前、中足跗节黄色, 端节黑色, 后足跗节主要黄色, 基跗节和端节黑色; 后足腿节腹面无长毛。翅透明, 基部稍黄, m_{1+2} 和 r_{4+5} 脉间内角为锐角。平衡棒淡黄色; 腋瓣白色。

雌性 额狭, 亮黑色, 仅前部两侧具狭的银色粉被条纹; 侧沟很发达, 中沟不明显。触角鲜橙色, 第 3 节非常大, 有或无上角。中胸背板和小盾片被直立黄色短毛, 背板两侧和小盾片后缘具粗大黑鬃。腹部第 1-3 节两侧被直立黄毛, 其余为平伏黑毛。

检查 1 号标本:

吉林(浑江, 1000m, 1963.VIII.6, 1♀)。

分布 吉林; 古北区北方带和新北区的。

(304) 拟毛黑蚜蝇 *Cheilosia parachloris* (Hervé-Bazin, 1929) (图 235)

Cheilosia parachloris Hervé-Bazin, 1929: 96.

Cheilosia (s. str.) *parachloris* (Hervé-Bazin, 1929); Barkalov et Cheng, 2004: 335-336.

体长 9.9-12.2mm, 翅长 8.8-11.8mm。

雄性 头顶被黄色长毛, 单眼三角呈等边三角形; 额宽, 光亮, 具黄色长毛; 颜中等宽, 下部稍加宽, 亮黑色, 被薄的灰色粉被, 中突和口缘裸, 中突小; 眼缘狭, 最宽处狭于第 3 触角节 2 倍多, 褐色, 密被灰色粉被和黄色长毛; 颊较低, 粉被和毛同眼缘; 新月片黄色; 触角窝分开。触角黄色, 第 3 节圆; 芒长, 黑色, 裸。复眼密被长毛, 上半部毛白色, 下半部褐色, 两眼连角为 90° , 其连线明显较额长。肩胛黑色, 密被灰粉, 中胸背板中部光亮, 两侧被灰色粉被, 具细刻点, 翅后胛褐色, 背板毛长而密, 顶端卷曲, 后半部毛黄色, 混杂一些黑毛; 侧板密被灰色粉被和黄色毛。腹部卵形, 略狭于中胸背板, 被褐粉和直立长黄毛。足的腿节黑色, 顶端狭黄色; 胫节主要黄色; 跗节黄色, 前足端部 2 节和中、后足第 5 节黑色, 后足腿节腹面被黄色长毛。翅黄色, m_{1+2} 和 r_{4+5} 脉间的内角为锐角。平衡棒黄色, 端部暗色。

雌性 额前部具狭灰色粉被横带。肩胛褐色, 中胸背板被半卧的黄色毛, 仅两侧后半部和小盾片后缘毛卷曲。前足跗节仅第 5 节黑色。腹部亮黑色, 具蓝色光泽, 第 1 节密被灰色粉被。

检查 55 号标本:

河北(官厅水库, 1957.IV, 1 个)、江苏(南京, 1919.V.7, 1935.IV.24-V.5, 16 个)、浙江(天目山, 1919.2-7, 1937.IV.19-V.2-5, 29 个; 莫干山, 1936.IV.23, 1 个、西天目山, 1937.IV.5-V.6, 2 个, 1960.V.2, 1 个, 1980.V.2, 1 个; 庆元百山祖, 1994.IV.18, 1 个)、福建(清源, 1300m, 1994.IV.18, 1 个)、湖北(广水, 1957.IV, 1 个)。

分布 河北、江苏、浙江、福建、湖北。




图 235 拟毛黑蚜蝇 *Cheilosia parachloris* (Hervé-Bazin)

a. 头 (前面观 ♂) (head of male in frontal view) b. 头 (背面观 ♀) (head of female in dorsal view) c. 触角 2、3 节 ♂ (2nd and 3rd antennal segments of male) d. 翅端 (top of wing) e. 背针突和尾须 (surstylus and circus) f. 阴茎内突 (aedeagus with apodema) g. 生殖腹板上叶 (superior lobe of hypandrium)

(305) 小黑蚜蝇 *Cheilosia parvula* Barkalov et Cheng, 2004 (图 236)

Cheilosia (s. str.) *parvula* Barkalov et Cheng, 2004: 336-337.

体长 6.4mm, 翅长 5.5mm。

雄性 头顶隆起, 具被直立长毛, 单眼三角为等边三角形; 额宽, 隆起, 光亮, 被黑色直立长毛; 颜宽, 下部稍加宽, 亮黑色, 密被黑色长毛, 中突大, 突出; 眼缘比较宽, 最宽处明显宽于触角第 3 节的 1/2, 黑褐色, 光亮, 毛黑色; 颊中等高, 光亮, 被黄色毛, 复眼下具褐斑点。两眼连角明显大于 90°; 新月片黑褐色; 触角窝宽分开。触角第 3 节短而圆, 褐色, 基腹部橙色, 被黄色粉被; 芒短, 黑褐色, 基半部毛很短。复眼密被黑色长毛, 其连线略长于额。肩胛黑色被灰粉, 中胸背板具细刻点, 略具光泽, 被灰色粉被, 具黄色短毛和黑色长毛; 小盾片后缘被黑色鬃状毛, 盾下缘缨长而稀, 黄色; 侧板隆起部分光亮, 其余具粉被, 被黄色毛长, 上部混杂黑毛。腹部长方形, 狭于胸, 黑色, 密被灰色粉被和白色毛, 两侧毛长。足大部分黑色, 胫节基部 1/3 及中足胫节末端褐色; 后足腿节腹面无长毛。翅褐色, m_{1+2} 和 r_{4+5} 脉间内角为 90°。平衡棒褐色,

初二校