

**(338) 紫泽黑蚜蝇 *Cheilosia splendida* (Shiraki, 1930)**

*Cheilosia splendida* Shiraki, 1930: 302.

*Cheilosia* (s. str.) *splendida* (Shiraki, 1930): Barkalov et Cheng, 2004: 349-350.

体长 9-11mm。

**雄性** 头顶很小，黑色毛长，单眼三角呈等边三角形；额短，很隆起，具细刻点，光亮，被黑色长毛；颜中等宽，亮，被明显黄色粉被，侧面观同 *Ch. chloris*，中突较大；眼缘很狭，被黄色粉被和很短的稀疏白毛；新月片黑色。复眼被褐色短毛，两眼连线约 2.5 倍于头顶长。触角第 3 节长于基部 2 节之和，长约 1.5 倍于宽，红色；芒很长，黑色，被黑色长毛。中胸背板具细刻点和强的紫色光泽；毛直立，长而密，黄色和黑色，两侧具 5 枚粗大的长鬃；小盾片后缘具 8 枚很长的黑鬃，盾下缘缨长而密，橙黄色；侧板被黄色粉被和同色毛，具长而粗的黑鬃。腹部黑绿色，中等光亮，被灰色粉被和黄色直立短毛，中部具一些黑色毛，基部 2 节具淡黄色长毛，其余各节毛很短，黑色。前足腿节基半部黑色，端半部黄色，后足腿节基部 2/3 黑色，端部 1/3 黄色；胫节黄色，具不明显黑环；跗节黄色，端节黑色，后足跗节背面稍变暗。翅狭，褐色，基部黄色，顶端黑色。腋瓣带黑色，边黑色。

**雌性** 头顶为头宽的 1/5；额具强绿色光泽，约 1/4 头宽，具横沟，两侧被明显粉被，毛黑色，较长而稀；颜在触角下很凸起。复眼被很短的黄褐色毛。触角第 3 节较宽，明显较雄长；芒约 2 倍于触角长。中胸背板强的金属光泽，黄色毛稀短；小盾片具强的绿色光泽。腿节和胫节有时几乎全黄色。（摘译自 Shiraki, 1930）

分布 中国台湾。

**(339) 褐跗黑蚜蝇 *Cheilosia yoshinoi* (Shiraki, 1930) (图 268)**

*Cheilosia yoshinoi* Shiraki, 1930: 267.

*Cheilosia yoshinoi* (Shiraki, 1930): Barkalov et Cheng, 2004: 359-360.

体长 7.5mm。

**雌性** 额蓝黑色，光亮，眼缘略被褐色粉被，具稀疏刻点；颜侧缘直，近下缘略宽，亮蓝黑色，除中突顶端和口缘外，被少量黄褐色粉被和褐色毛，侧面观在触角基部之下很凹入，中突尖；眼缘狭，被灰黄色粉被和黄色毛。复眼被褐色毛。触角黄褐色，第 3 节上缘褐色，长于基部 2 节之和，长约 1.5 倍于宽；芒褐色，基部黄色，1.5 倍于触角长。肩胛黄褐色，中胸背板亮绿黑色，具多刻点，被黄褐色短毛，翅后胛褐色，具 2 枚中等长的黑鬃；小盾片同背板，后缘被很多黄色长毛和一些黑色鬃状毛；侧板黑色，盾沟亮