

12. 腹部仅具 3 对黄斑；小盾片黄色 短毛长角蚜蝇 *Ch. lanulosum*
 腹部具 4 对黄斑 13
13. 小盾片红黄色；第 3 触角节为第 1 节长的 2 倍；体较小 红盾长角蚜蝇 *Ch. rossicum*
 小盾片污黄或褐色；第 3 触角节与第 1 节约等长；体较大 14
14. 腹部第 3-4 节黄色横带相连 中华长角蚜蝇 *Ch. chinense*
 腹部第 3-4 节黄色横带间断 突额长角蚜蝇 *Ch. coreanum*
15. 翅中部具大的黑褐色斑；腹部具 4 对黄斑，第 2 背板黄斑宽 16
 翅斑小，位于翅前缘，腹部黄斑等宽 18
16. 腹部侧缘整个黑色 西伯利亚长角蚜蝇 *Ch. sibiricum*
 腹部侧缘红色或略具黑色 17
17. 前足和中足腿节全黄色 黄股长角蚜蝇 *Ch. festivum*
 前足和中足腿节基部黑色 土斑长角蚜蝇 *Ch. vernale*
18. 腹部卵圆形，第 2-5 节具“八”字形黄斑，斑外端宽 八斑长角蚜蝇 *Ch. octomaculatum*
 腹部狭长 19
19. 腹部第 2-4 背板各具 1 对较狭的黄斑，两斑内端接近，第 5 背板几乎全黄色，具倒“V”字形黑斑 日本长角蚜蝇 *Ch. shirakii*
 腹部第 2-5 背板具中断的黄色弓形横带 丽纹长角蚜蝇 *Ch. Elegans*

(6) 棕腹长角蚜蝇 *Chrysotoxum baphrus* Walker, 1849 (图 15, 图版 I : 3)

Chrysotoxum baphrus Walker, 1849: 542; Knutson et al., 1975: 326; Huang, 1992: 1141; Li & He, 1992: 72; Huang et al., 1996: 122.

Chrysotoxum indicum Walker, 1852: 218.

Chrysotoxum sexfasciatum Brimetti, 1907: pl. xiii, fig. 9; 1908: 89.

Chrysotoxum citronellum Brunetti, 1908: 90.

Chrysotoxum mundulum Hervé-Bazin, 1923: 27.

体长 10-14mm。

雄性 头顶三角小，黑色或略带紫铜色光泽，被黑毛；额三角小，黑色，毛黑褐色；颜柠檬黄色，正中具黑色纵条，有时两侧橘红色，颜下部两侧棕红色，有时具不明显的黑色纵条；后头黑色，覆黄粉被，上部毛黄色，下部毛白色。触角黑色，基部 2 节腹缘及第 3 节基部棕红色，第 3 节长明显超过基部两节之和；芒黄棕色。中胸背板黑色，中部具 1 对达小盾沟之前的黄灰色纵条，两侧黄条较宽；小盾片柠檬黄至棕色，毛淡黄至棕黄色；侧板黑色，具黄铜色光泽，中侧片及腹侧片具黄斑。腹部大部棕黄色；第 1 背板全部及各背板前缘黑色；第 2 背板近中部具黑色横带，该横带两端达背板后缘，背板

正中具短黑色纵条，与黑色前缘相连，后缘黄色；第3-4背板各具“八”字形黑斑，黄色后缘中部向前呈三角形突出；第5背板黑斑通常呈“^”字形，两侧黄斑斜置，端部黄斑大，有时近圆形，腹部侧缘棕黄色；足大部分黄色，中、后足基节棕褐色；雄性后足腿节有时端部棕褐色，后足胫节有时端半部橘红色或棕褐色，后足跗节有时褐色。翅淡灰色，前部稍带黄色。腋瓣白色，边缘橘红色，平衡棒淡黄色。

雌性 额中部两侧具较大的棕黄色粉被斑，额前端棕黄色，光亮，毛棕黄色；颜正中纵条棕红色，狭。腹部黄色部分较雄性更扩展，各背板黑色前缘狭，第1背板前部棕黄色，后缘黑色，两侧向前呈弧形突出，第5背板黑色，正中两侧各具大黄斑，后缘黄色。足全部棕黄色。

共检查26号标本：

福建(崇安，250-800m，1960.VI.11-IX.8，3个，建阳，250-360m，1960.III.17-VI.11，12个，邵武，150-190m，1960.III，1个)、湖南(慈利江垭林场，1988.VIII.31，1个)、广东(乐昌九峰，1983.X.27，1个)、广西(阳朔，150m，1963.VII.18-23，2个)、云南(西双版纳，1200-1600m，1958.VII.24-25，2个，孔明山，1957.X.26，3个)、西藏(墨脱，1600m，1982.XI.6，1个)。

分布 福建、湖南、广东、广西、云南、西藏(墨脱)；老挝，印度，尼泊尔，锡兰。




图15 棕腹长角蚜蝇 *Chrysotoxum baphrus* Walker ♂
腹部(背面观)(abdomen in dorsal view)

(7) 黄颊长角蚜蝇 *Chrysotoxum cautum* (Harris, 1776) (图版 I : 4)

Musca cautum Harris, 1776: 60.

Chrysotoxum sylvarum Wiedemann, in Meigen, 1822: 171.