



图 18 隐条长角蚜蝇 *Chrysotoxum draco* Shannon  
腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

(12) 丽纹长角蚜蝇 *Chrysotoxum elegans* Loew, 1841 (图 19, 图版 I : 8)

*Chrysotoxum elegans* Loew, 1841: 140; Li et He, 1992: 70; Huang et al., 1996: 123.

*Chrysotoxum bigoti* Giglio-Tos, 1890: 154.

*Chrysotoxum latilimbatum* Collin, 1940: 157; Peck, 1988: 58.

体长 10-15mm。

复眼被淡色短细毛。头顶和额黑色，被黑褐色密毛；额两侧沿眼缘具黄白色粉被；颜黄色，具亮黑色中条和侧条斑；后头密覆黄白色粉被和黄毛。触角黑色，第 3 节明显短于基部两节之和。中胸背板黑色，具 1 对灰色粉被中条，中条末端达背板中部，两侧具宽的亮黄色侧条，该侧条在盾沟后宽中断，背板毛褐色短；侧板黑色，具 3 黄斑，分别位于前胸侧片、中侧片和腹侧片上，以中侧片黄斑最大；小盾片亮黄色，具黑色中斑，毛同背板。腹部黑色，第 2-5 节具中部中断的黄色弓形横带，带两侧与各节背板黄色后缘相连，黄色后缘横带以第 2 节最窄，以后逐渐加宽；各节毛很短，不明显，后侧缘角不突出。足红黄色，胫节黄色。翅淡黄色，前缘黄色明显。

共检查 18 号标本：

北京(百花山, 1170-1570m, 1963.VIII.24, 1 个, 1200m, 1973.V.28-VI.1, 3 个)、河北(小五台山, 1200m, 1964.VIII.25, 1 个)、黑龙江(宁安, 1970.IX.4, 1 个)、吉林

(1939.VI.23-1940.VII.2, 6 个)、辽宁(清原, 1954.VII.20, 1 个)、浙江(天目山, 1936.VI.10, 1 个)、湖南(桑植天平山, 1981.VI.17, 1 个)、陕西(华山, 1200-1300m, 1963.V.23, 1 个)、新疆(哈巴河, 500m, 1960.IX.1, 1 个, 额敏, 550m, 1960.IX.6, 1 个)。

**分布** 北京、河北、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、福建、江西、湖南、陕西、新疆; 原苏联; 欧洲。



图 19 丽纹长角蚜蝇 *Chrysotoxum elegans* Loew ♂  
腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

(13) 侧宽长角蚜蝇 *Chrysotoxum fasciolatum* (de Geer, 1776) (图 20, 图版 I : 19)

*Musca fasciolatum* De Geer, 1776: 124.

*Syrphus lineola* Preyssler, 1793: 370.

*Chrysotoxum costale* Wiedemann in Meigen, 1822: 172.

*Chrysotoxum marginatum* Meigen, 1822: 171.

*Chrysotoxum albopilosum* Strobl, 1893: 197.

*Chrysotoxum sachalinense* Matsumura, 1911: 73.

*Chrysotoxum fasciolatum* (de Geer, 1776): Peck, 1988: 58.

**体长** 16mm。

体粗大。头顶和额黑色, 被黑色毛, 额上部覆黄色粉被, 雌性额中部具 1 对大的三角形黄斑; 颜黄色, 具黑色中条和侧条斑, 该条斑从触角基部下侧至口缘; 颊红黄色; 后头密覆黄粉被。复眼覆淡褐色短毛。触角黑色, 第 3 节明显长于基部两节之和; 芒黄