

(19) 八斑长角蚜蝇 *Chrysotoxum octomaculatum* Curtis, 1837 (图 25, 图版 I : 13)

Chrysotoxum octomaculatum Curtris, 1837: 653; Peck, 1988: 61; Huang *et al.*, 1996: 124.

Musca elegans Villers, 1789: 464.

Chrysotoxum chysopolitum Rondani, 1845: 199.

Chrysotoxum sachenii Giglio-Tos, 1890: Synonymized by Sommaggio, 2001: 115-126.

体长 11-13mm。

额黑色，被黑毛，两侧覆灰色粉被；颜亮黄色，具黑色中纵条和侧纵条。触角黑色，3 节几乎等长；芒棕黄色。胸部黑色，中胸背板具 2 条宽的灰色背中线，两侧具黄色纵条；侧板具黄斑；小盾片黄色，具暗黑色中斑。翅前缘具黄斑。腹部卵圆形，背板隆起，侧缘隆脊发达，第 2-5 节具“八”字形黄斑，该斑外侧宽，各节后缘棕黄色。前足红黄色，胫节淡黄色。

共检查 36 号标本：




图 25 八斑长角蚜蝇 *Chrysotoxum octomaculatum* Curtis
腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

北京(百花山, 1200m, 1973.VI.1, 3 个, 小龙门, 1997.VI.1, 1 个)、河北(兴隆雾灵山, 1700m, 1963.VII.5, 1 个)、内蒙古(凉城, 1980.VIII, 1 个)、浙江(天目山, 1937.V.3-VII.22, 13 个, 1957.VI.24, 1 个)、江西(牯岭, 1935.VII.16-VIII.21, 4 个)、湖北(兴山龙门河, 1450m, 1993.VI.23, 3 个, 1300m, 1994.V.7, 1 个)、湖南(慈利江垭林场, 1998.VIII.27,

1 个, 桑植天平山, 1981.VII.14, 1 个)、四川(万县王二包, 1200m, 1994.V.28, 2 个)、甘肃(宕昌哈达铺, 2260m, 1996.VII.9, 4 个)。

分布 北京、河北、内蒙古、黑龙江、浙江、江西、湖北、湖南、四川、甘肃; 原苏联; 欧洲。

(20) 红盾长角蚜蝇 *Chrysotoxum rossicum* Becker, 1921 (图 26, 图版 I : 14)

Chrysotoxum rossicum Becker, 1921: 78; Peck, 1988: 62.

体长 10-13mm。

头顶和额黑色, 具光泽, 雌性额中部具 1 对灰黄色粉被斑; 颜黑褐色至红褐色, 具宽的黄色侧条。复眼裸。触角黑色至黑褐色, 第 3 节明显短于基部两节之和。中胸背板黑色, 略具光泽, 背板两侧具宽的黄色纵条, 在盾沟后中断; 侧板黑色, 具 1 块大黄斑; 小盾片红黄色; 中胸背板和小盾片密被黄毛。腹部黑色; 第 2-4 背板各具弓形黄色横带, 中间宽且中断; 第 5 节具 1 对黄色小侧斑; 所有黄斑均不达背板侧缘; 腹板第 3 节具 1 对大黄斑; 第 4 节具 1 对很小的黄斑。足基节、转节及腿节基部黑色, 其余红黄色。翅中部具大褐斑。




图 26 红盾长角蚜蝇 *Chrysotoxum rossicum* Becker ♂
腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

共检查 4 号标本: