

缘浅黄色。后足基节内侧近端部处有 3 根长度超过转节 2/3 长的黑色刺毛；足土黄色，跗节黄褐色。翅透明。(摘自 Li and He, 1992)

分布 新疆(呼图壁)。




图 33 黑刺长角蚜蝇 *Chrysotoxum nigricentivum* Li et He (仿 Li and He, 1992)

a. 头部 (侧面观)(head in lateral view) b. 触角 (antenna) c. 腹部 (背面观)(abdomen in dorsal view) d. 雄性外生殖器 (侧面观) (genitalia in lateral view) e. 雄性外生殖器 (背面观) (genitalia in dorsal view) f. 上叶 (superior lobe) g. 阳茎 (aedeagus)

(31) 梯长角蚜蝇 *Chrysotoxum tjanshanicum* Peck, 1974

*Chrysotoxum tjanshanicum* Peck, 1974: 912; 1988: 63; Li & He, 1992: 70; Huang *et al.*, 1996: 125.

额黑色，被黄色微毛；颜柠檬黄色，中突较大，颜中纵条黑色。触角黑褐色。胸部黑色，具金属光泽；侧板具柠檬黄色斑；小盾片柠檬黄色，中部黑褐色，被稀疏短毛。腹部卵圆形，黑色，第 2-5 节背板上各有 1 对柠檬黄色斑，不伸达侧缘。翅前缘黄褐色。(摘自 Li and He, 1992)

分布 新疆；原苏联。