

3个；长白山，750m，1987.VII.2，1个）。

本种为我国新记录种。

分布 河北、吉林；原苏联，欧洲。




图 330 拟虻皮毛蚜蝇 *Criorrhina asilica* (Fallén) (仿 Sack, 1932)

a. 头部 (前面观) (head in frontal view) b. 腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

我国有记载而未见标本的种类：

(449) 台湾皮毛蚜蝇 *Criorrhina formosana* (Shiraki, 1930) (图 331)

*Criorrhina formosana* Shiraki, 1930: 51-52.

*Criorrhina formosana* (Shiraki, 1930): Knutson *et al.*, 1975: 360.

体长 13mm。

体明显小；额较宽；颜较长，中突和口缘间几乎平直，眼缘下部和头的后侧覆黑褐色粉被。触角褐色；芒同触角，端半部黑色。前足全黑褐色，被黑色毛；中、后足腿节红黄色毛长而密，基部混杂黑色毛；后足腿节很长，被橙黄色毛，中足胫节具略长的同色毛。(摘译自 Shiraki, 1930)

分布 中国台湾。

(450) 红足皮毛蚜蝇 *Criorrhina rubripes* (Matsumura, 1916)

*Mallota rubripes* Matsumura, 1916: 218.

*Criorrhina rubripes* Shiraki, 1930: 50-51.