



图 63 具带毛食蚜蝇 *Dasysyrphus brunettii* (Hervé-Bazin) ♀
腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

(84) 四灰条毛食蚜蝇 *Dasysyrphus eggeri* (Schiner, 1862)

Syrphus eggeri Schiner, 1862: 303.

Syrphus grisescens Şuster et Zilberman, 1958: 325.

Dasysyrphus eggeri (Schiner, 1862): Peck, 1988: 14; Huang *et al.*, 1996: 137.

体长 10-11mm。

雄性 头部黄色，具白色或淡黄色毛；颜正中黑色中条狭；后头黑色，毛黄色；雌性头顶具四边形黑斑，额黑色，中部覆黄粉被，前部黄色，光亮。触角红黄色，第3节明显长卵形，背端部略呈黑褐色；芒基半部黄棕色，端半部黑褐色。中胸背板黑色，具光泽和4灰黄色粉被纵条，肩胛、背侧片、翅后胛黄棕色；小盾片黄色，透明，毛色常变化；侧板黑色，具黄色粉被纵斑，中侧片后部和翅侧片上部、腹侧片前部常具明显或不明显的黄色粉被斑。腹部明显拱而狭，暗黑色；第1背板黑色，两侧及前部黄色；第2背板中部具1对大的卵形或近三角形黄斑，该斑不达背板侧缘；第3、4背板各具1对斜置的弧形黄斑，该斑中部宽相连，约5/8与背板前缘相接，而后黄斑斜行至背板侧缘中部，但不达背板侧缘；第4、5背板后缘黄色，第5节侧缘黄色，仅中部具1黑色狭横斑。足淡黄色，后足跗节棕黄色，第2、3跗节色较暗。翅透明，翅痣黑褐色。

检查1号标本：

新疆(皮山布琼，2600m，1988.VI.17，1个)。

分布 新疆；原苏联，蒙古国；欧洲。