

(98) 卵腹直脉食蚜蝇 *Dideoides ovatus* Brunetti, 1908

Dideoides ovatus Brunetti, 1908: 54; Knutson *et al.*, 1975: 312; Sun, 1992: 1100; Huang, 1992: 1136; Huang *et al.*, 1996: 140.

体长 12-16mm。

雄性 头部棕黄色，仅头顶三角黑色，被黑毛；额和颜两侧密覆金黄色粉被，额毛黑褐色，端部裸，光亮，正中色稍暗；颜毛黄色；后头灰绿色，覆粉被和黄毛。触角棕至棕红色，有时第3节背侧色稍暗；芒橘黄至棕色。中胸背板暗金绿色，正中具不明显的3条棕褐色狭条，两侧自肩胛至翅后胛棕红色或橘黄色；背板被黄或棕黄色毛，两侧毛棕红色；小盾片深棕红色，被黑毛，前、后缘及侧缘有时具黄毛；侧板与背板同色，覆灰黄色薄粉。腹部黑色，第1背板黑绿色；第2背板基部金绿色，具1对橘黄色长形横斑，斑内端相互靠近，几呈1条横带，斑外端明显扩大，几呈三角形，并达背板侧缘，背板后缘狭棕黄或橘红色；第3背板中部橘黄色横带较宽，前缘直或稍向前微突，后缘正中呈弧形向前凹入，背板后缘棕黄色较宽；第4背板大部棕黄或橘红色，仅前缘黑色狭，正中具极狭“八”字形黑斑；第5背板橘红色。背板具较长竖立黄毛。足黄至橘黄色，基、转节、前足和中足腿节基部1/3及后足腿节基半部均为黑色。翅淡灰黄色。腋瓣黄色。平衡棒橘黄色。

雌性 颜正中自头顶向前有1墨绿色宽纵条，黑色额毛较雄性密。第3触角节背侧黑色。中胸侧板黄绿色。腹部第2背板斑外端略狭，很少达侧缘。

共检查 71 号标本：

湖北(兴山, 1300m, 1994.IX.8, 2个)、广西(龙胜, 1800m, 1963.VI.20, 1个)、四川(峨眉山, 1955.VI.17, 1个, 800-3200m, 1957.IV.25-VIII.24, 42个; 西昌, 2800m, 1974.VIII.5, 1个; 雅安, 1984.IV-VI, 2个)、云南(泸水片马, 2300m, 1981.V.2, 1个; 勐龙版纳勐宋, 1600m, 1958.IV.24, 1个; 蒙自, 200m, 1956.V.31, 1个; 河口, 200m, 1956.VI.8-12, 5个; 金平勐喇, 340-380m, 1956.IV.13-V.28, 10个; 橄榄坝 1957.IV.181个; 车里, 620m, 1957.IV.22, 1个)、陕西(宁陕, 2200m, 1979.VIII.3, 1个)。

分布 湖北、广西、四川、云南、陕西; 印度, 老挝。

21. 斑翅食蚜蝇属 *Dideopsis* Matsumura, 1917

Dideopsis Matsumura, 1917: 142. Type species: *Eristalis aegrota* Fabricius, 1805.

Aegrotomyia Frey, 1946: 158. Type species: *Eristalis aegrotus* Fabricius, 1805.