

雄性 头顶三角区长约为宽的 1.5 倍，黑色，毛同色，仅后缘毛棕黄色；额黄褐色，毛黑色，密被黄粉被，额角 95° ；颜两侧被黄色长毛及同色粉被；口前缘黑色。复眼接缝短于头顶的长度。触角黄色，略偏褐；芒褐色。中胸背板黑色，具金属光泽，前部具 2 条明显的灰色纵条，背板被黄色毛；小盾片毛黄色，后端混有少量黑毛；中胸侧板黄褐色。腹部黄色，第 1 背板中域黑色；第 2 背板前、后缘及中央成“T”字纹黑色；第 3 背板前、后缘有 1 条黑色横带；第 4 背板后方 $3/4$ 处为黑色横带；第 5 背板中央具“人”字纹黑斑。前足、中足腿节及跗节背面淡褐色，其余黄色；后足腿节黄色，被黑色短毛，胫节及跗节褐色被黄色短毛。翅淡色。腋瓣及缘毛黄色；平衡棒黄色，端部色略深。

雌性 腹部第 3、4 背板的前后黑色横带内缘的中央呈角状内凹；第 5 背板中央为 1 条弧形黑斑。(摘自 Chu and He, 1993)

分布 江苏(南京)。

(107) 毛缝垂边食蚜蝇 *Epistrophe setifera* Chu et He, 1993 (图 75)

Epistrophe setifera Chu et He, 1993: 149-150.




图 75 毛缝垂边食蚜蝇 *Epistrophe setifera* Chu et He (仿 Chu and He, 1993) ♂

a. 触角 (antenna) b. 头顶 (vertex) c. 头部 (侧面观) (head in lateral view) d. 腹部 (abdomen) e. 雄性外生殖器 (侧面观) (genitalia in lateral view) f. 第 9 腹板 (hypandrium) g. 上叶 (superior lobe) h. 阴茎 (aedeagus)

体长 13.0mm，翅长 11.0mm。

雄性 头顶黑色，毛黑色，后缘毛黄色；额深黄色，被黑长毛和黄白色粉被，额角约 80°；颜淡黄色，除中突色深且光滑外，均被黄色长毛和黄白色粉被；复眼接合缝的长度短于头顶的长，并着生有数根黑长毛。触角橘黄色；第 3 节长椭圆形，色微红。中胸背板黑色，前者具金属光泽，被黄毛和黄色粉被，两侧粉被黄色；背板中央具 2 条不太明显的粉被纵条，其后端止于背板 4/5 处；中胸侧板黄褐色，覆浓密的黄色粉被，毛黄色；小盾片深黄色，被黄长毛，后缘中部具少量黑毛。腹部黄色，第 1 背板中域具扁棱形黑斑；第 2 背板前、后缘具三角形黑带，中部的三角形黄斑连接成宽带；第 3 背板的前后缘各具 1 条黑色横带；第 4 背板后方 3/4 处具 1 条黑色细横带，其两端不达侧缘。足除后足跗节褐色外，其余均为黄色；前、中足及后足腿节基部 3/5 被黄色长毛，后足腿节端部 2/5、胫节和跗节的背面被黑色短毛；各足腿节的端部腹缘均裸。翅呈微黄色。腋瓣黄白色，边缘及缘毛黄色。平衡棒黄白色，基部及端部色略暗。(摘自 Chu and He, 1993)

分布 黑龙江(宁安镜泊湖)。

(108) 华垂边食蚜蝇 *Epistrophe splendida* Chu et He, 1993 (图 76)

Epistrophe splendida Chu et He, 1993: 152.




图 76 华垂边食蚜蝇 *Epistrophe splendida* Chu et He (仿 Chu and He, 1993) ♂

a. 触角 (antenna) b. 头顶 (vertex) c. 头部 (侧面观) (head in lateral view) d. 腹部 (abdomen) e. 雄性外生殖器 (侧面观) (genitalia in lateral view) f. 第 9 腹板 (hypandrium) g. 上叶 (superior lobe) h. 阳茎 (aedeagus)