

(115) 暗盾密毛食蚜蝇 *Eriozone nigroscutellata* Shiraki, 1930 (图 81, 图版 II: 18)

Eriozone nigroscutellata Shiraki, 1930: 333; Knutson *et al.*, 1975: 315; Sun, 1992: 1104; Huang *et al.*, 1996: 144.

体长 12-15mm。

雄性 头顶三角较长，黑色；额棕黄色，在触角基部两侧及前端具褐斑；头顶和额被黑毛；颜约 1/2 于头宽，黄色，具黄毛，仅上部两侧有若干黑毛；颊及口缘黑褐至黑色，被黑毛；后头覆黄粉被及黄毛。雄性复眼合生，被褐毛。触角黑色，第 3 节长于前两节之和，长约 2 倍于宽，雌性较雄性略大；芒裸，与触角等长，基半部粗，端半部细。中胸背板黑色，略具光泽和 2 对灰色粉被宽纵条，中间 1 对纵条较明显，毛黑色，混以黄毛；小盾片长，黑褐色，略带光泽，具淡色长毛；侧板黑色，具同色长毛。腹部黑色，密被黑毛，第 1-3 背板全部、第 4 背板前部黑色，第 4 背板大部和第 5 背板红黄色，前者被长的金黄色毛；后腹部及尾器红棕色。足黄褐或红褐色，基节、转节和腿节基半部黑色，胫节端半部具黑褐色环，前、中足此环不明显，后足明显；足毛大部分黑色。翅透明，基部及翅前缘中部具明显黑褐色大斑。腋瓣及平衡棒黑色。




图 81 暗盾密毛食蚜蝇 *Eriozone nigroscutellata* Shiraki ♀ (仿 Shiraki, 1930)

a. 头部 (正面观) (head in frontal view) b. 头部 (背面观) (head in dorsal view) c. 头部 (侧面观) (head in lateral view)
d. 触角 (antenna)

共检查 14 号标本：

河北(小五台山西台, 2600m, 1964.VI.21, 1 个)、吉林(长白山, 1982.VII.13, 1 个)、四川(马尔康, 2700m, 1983.VIII.18, 1 个; 汶川卧龙, 2600m, 1983.VIII.8, 2 个; 峨眉山, 1800-3200m, 1957.VIII.10-23, 5 个)、云南(德钦梅里雪山, 3180-3350m, 1982.VII.22-25,

初二版

2 个；中甸大雪山垭口，4000m，1981.VIII.20，1 个；泸水姚家坪，2500m，1981.VI.5，1 个）。

分布 河北、吉林、四川、云南、西藏、台湾。

(116) 黄盾密毛食蚜蝇 *Eriozonea syrphoides* (Fallén, 1817) (图 82)

Scaeva syrphoides Fallén, 1817: 36.

Syrphus oestriformis Meigen, 1822: 315.

Eriozonea syrphoides (Fallén, 1817): Peck, 1988: 23.

体长 15mm。

雌性 头顶和额黑色，覆黄色粉被和黑色直立毛；额前方裸，光亮，毛淡色；颜黄褐色，被同色毛，中突小；颊黑色，毛黄白色；后头黑色，覆黄白色粉被和黄毛。复眼毛黄褐色。触角黑色；芒棕色，端部黑色，基半部粗。中胸背板暗黑色，前、后部被棕黄色毛，中部被黑毛，背侧片、翅后胛及中侧片上部被棕黄色长密毛；侧板黑色，毛棕黄色；小盾片黄色，密被棕黄色长毛。腹部基部 3 节黑色，第 1、2 节密被棕黄色长毛，第 3 节密被黑短毛，第 4、5 节红黄或锈红色，被同色毛。足基节、转节、腿节黑色，腿节端部及胫、跗节红黄色或红褐色。翅中部具明显的黑褐色斑。

外来鉴定标本，无具体信息。

本种为我国新记录种。

分布 新疆(可可西里)；原苏联；欧洲。




图 82 黄盾密毛食蚜蝇 *Eriozonea syrphoides* (Fallén) (仿 Stabbs, 1933)

整体 (wholly)