

Eristalinus laetus (Wiedemann, 1830): Knutson *et al.*, 1975: 348.

体长 6-8mm。

雄性 头顶三角黑色，被黑毛；额三角亮黑色，毛黑色；颜黑金绿色，被灰白色毛。复眼红色，具小的暗色斑点。触角黑色，有时第3节下侧橙褐色；芒褐色。胸部淡黑金绿色，具灰褐色毛；背板两侧金绿色；小盾片亮黑色，略具蓝色和灰褐色毛；腹侧片灰褐色，被灰黄色毛。腹部第1节暗灰黑色；第2节暗黑色，后缘中央略狭亮，侧缘具宽的三角形金绿色斑；第3节亮黑色，两侧具金绿色横斑，其上具1对灰色狭横斑；第4节暗黑色，具2个灰色横斑，形成1弯曲带，并在前缘中部相接；腹背被毛灰褐色，侧缘毛较淡。足黑色，各足胫节末端、前足胫节基半部、后足胫节基部橙色狭；前足基跗节、中足跗节基部2节或多或少为橙色；足毛淡黄色。翅近透明。平衡棒橙色。

雌性 中胸背板亮黑色，肩胛和两侧沿侧缘至盾沟灰黄色或灰色，它们在两侧延伸似5条纵条纹近达翅后胛，中间2条纵条纹宽分开，狭；侧板灰黄色或近灰色，有时略具光泽。腹部第2节侧缘长横斑黄色，且透明，每侧具狭的灰色斑；第3、4节灰色斑宽，相连并形成1宽“V”字形带，其中间触及节的前缘。

分布 台湾、香港；印度，尼泊尔。

(383) 八斑斑眼蚜蝇 *Eristalinus octopunctatus* Li, 1995 (图 296)

(Lathyrrophthalmus) octopunctatus Li, 1995: 45-46.

体长 10.0-11.0mm。

雄性 头宽大于长；头顶黑色，覆浅黄色粉被及同色毛，中部有1细脊；额黄色，具浅黄色粉被和黄色毛；颜黑色，被浅黄色粉被及同色毛，口缘之上具1横缝；中突大，黄色，中带浅黄色，不伸达触角基部。复眼具许多黑色斑点。触角黄色；芒黄褐色，裸。中胸背板黑色，被同色细毛，具5条纵向黄色粉被条纹，中间3条在小盾片之前相汇；小盾片暗黄色，被同色的细毛；中胸侧板黑色，具白色粉被和浅黄色毛。腹部黑色，第1背板黄色，中域具四边形黑斑，第2背板前缘具1对黄色四边形的斑纹，第3、4背板前缘各具1对黄斑，第5背板前缘具小的三角形黄色斑。前足腿节黑色，端部黄色，胫节基半部黄色，端半部黑色，跗节黄褐色；中足腿节基部2/3黄色，端部1/3黑色，胫节黄色至黄褐色；后足腿节黑色，细，胫节黑色，基部黄色，中、后足跗节黄褐色；足毛主要为浅黄色，后足腿节腹面具几排黑刺。翅透明，翅痣黑色。

分布 广东(顺德)。




图 296 八斑斑眼蚜蝇 *Eristalinus octopunctatus* Li (仿 Li, 1995)

a. 头部 (正面观) (head in frontal view) b. 头部 (侧面观) (head in lateral view) c. 头部 (背面观) (head in dorsal view) d. 触角 (antenna) e. 腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

61. 管蚜蝇属 *Eristalis* Latreille, 1804

Eristalis Latreille, 1804: 194. Type species: *Musca tenax* Linnaeus, 1758.

Tubifera Meigen, 1800: 34. Type species: *Musca tenax* Linnaeus, 1758.

Elophilus Meigen, 1803: 274. Type species: *Musca tenax* Linnaeus, 1758.

Eristaloides Rondani, 1845: 453. Type species: *Musca tenax* Linnaeus, 1758.

Eristalomya Rondani, 1857: 38. Type species: *Musca tenax* Linnaeus, 1758.

Eriops Liroy, 1864: 743. Type species: *Musca tenax* Linnaeus, 1758.

属征 头等于或略宽于胸，近半圆形。额微突出；复眼被毛，无斑点，雄性两眼接眼，雌性离眼；颜具明显中突，口上缘适当突出。触角正常大小，第3节卵形；背芒基生，裸或基半部被毛。中胸背板近方形。腹部与胸部等宽，卵形、锥状或略长。足简单。翅 r_{4+5} 脉明显凹入 R_5 室， R_1 室封闭，具柄。

分布 世界各大动物地理区均有分布。

我国有描述的种类共 10 种，其中 4 种有标本。

种 检 索 表

1. 触角芒至少基部具羽状长毛 2