

足胫节极基部、中后足跗节基部 2 节黄色至橘红色；足毛灰黄色，后足胫节具黑毛。翅近乎透明，Sc 室末端有 1 小暗斑。腋瓣、平衡棒棕黄色。

雌性 触角近黑色。腹部较雄性暗，黑色部分更扩大，第 2-5 背板各具灰白色至棕黄色横带，第 5 背板横带细狭，有时不明显。

共检查 40 号标本：

江西(莲塘, 1955.XII.5, 2 个)、广西(龙胜, 1150-1420m, 1963.VI.19-22, 7 个)、四川(会理, 1850-2100m, 1974.VII.20, 1 个)、云南(昆明黑龙潭, 1900m, 1958.X.8, 1 个；西双版纳, 800-1600m, 1957.III.28-1958.V.27, 4 个；大理点苍山, 2600m, 1981.VI.27, 5 个；下关, 2050m, 1955.V.30, 1 个；昆明, 1900m, 1958.X.8, 3 个；永胜, 2300m, 1984.VII.8, 1 个；丽江, 2400m, 1981.VII.7, 1 个；泸水, 1900m, 1981.VI.11, 1 个；墨江, 1300m, 1955.III.27, 2 个、保山至龙陵, 1000-1600m, 1955.V.14, 1 个)、西藏(吉隆, 2800m, 1975.VII.23-VIII.19, 2 个；樟木, 2200-3300m, 1975.VI.23-VII.7, 2 个；墨脱, 900m, 1974.IX.3, 2 个；墨脱背崩, 850m, 1983.V.23, 1 个；林芝, 3050m, 1983.VIII.7, 1 个；波密易贡, 2300m, 1983.VIII.18, 1 个)、台湾(1935.VI, 1 个)。

分布 江西、广西、四川、云南、西藏、台湾；日本，东洋区。




图 293 黑股斑眼蚜蝇 *Eristalinus paria* (Bigot)

a. 头部 (侧面观) (head in lateral view) b. 腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

(376) 黑跗斑眼蚜蝇 *Eristalinus quinquelineatus* (Fabricius, 1781) (图版 V: 17)

Syrphus quinquelineatus Fabricius, 1781: 425.

Eristalis fasciatus Meigen, 1835: 70, 143.

Eristalis quiquivittatus Macquart, 1849: 465.

Eristalis jucundus Walker, 1849: Synonymized by Thompson, 1988: 214.

Eristalinus quinquelineatus (Fabricius, 1781): Peck, 1975: 183-184; Huang *et al.*, 1996: 183.

体长 10-12mm。

雄性 头顶亮黑色，具黑色毛，并混有黄色毛；额黑色，密覆灰白色或黄白色粉被和银色光泽，额在触角基部上方具三角形亮黑斑，额毛大部分黄白色，长而密，后部混有黑色毛；颜除中突及2细狭侧条外，密覆淡灰色或灰黄色粉被及黄色毛，颜下部两侧亮黑色狭。复眼红黄色或黄棕色，具黑褐色圆形小斑，有时斑相连；眼毛短，褐色，仅上部明显；两眼连线为头顶三角长的2倍。触角红黄色，基部2节及第3节背侧黑褐色；芒黄棕色，光亮。中胸背板亮黑色，稍带铜色光泽，具5条黄灰色纵条，中间3条细狭，外侧2条较宽，背板被毛灰黄色；侧板黑色，大部覆灰色粉被及灰黄色绵毛；小盾片棕黄色或棕褐色，毛灰黄色。腹部短于头、胸之和，基部3节两侧红黄色，中部暗灰色至暗黑色；第2背板红黄色侧斑大，近方形，几乎占整个背板，斑两侧略具光泽，背板中部具近“T”字形黑斑，该斑达前、后缘；第3背板斑纹与前者相近，但稍小，暗黑色前缘缺如，亮黑色后缘较前节宽，黄斑除中部外光亮；第4背板前半部暗黑色，后半部亮黑色，且具铜色光泽；第3、4背板各具稍呈弓形的淡色粉被斑；尾节亮黑色或古铜色。足黑色，具光泽；前、中足胫节基半部、后足胫节基部1/4-1/3黄色或棕黄色；跗节黑色，中足基跗节基部黄色，后足基跗节基部略带棕红色。翅黄色，透明。腋瓣与平衡棒黄色。

雌性 额两侧近乎平行，密覆灰黄色粉被，中部正中具卵圆形暗斑。腹部较雄性狭，第2背板黄斑较小，第2-5背板大部暗黑色，仅前侧及宽的后缘亮黑色，各节具灰黄色粉被横带，第1条横带中间断裂，位于背板中部，第2-4条横带近背板前缘。

共检查19号标本：

福建(漳州, 1963.VII.30, 1个)、广东(西沙, 1974.XII.23, 1个；湛江, 1个；广州, 1983.X.18, 1个)、广西(桂林, 1935.VIII.19, 1个；桂林雁山, 200m, 1963.VI.5, 2个, 1952.VIII.6-IX.17, 4个；良丰, 1951.IX.25-1952.III.30, 2个)、海南(1934.XI.28, 1个)、四川(丰都, 170m, 1994.X.4, 3个、万县, 1200m, 1994.V.28, 1个)、香港(1932.XII.3, 1个)。

分布 江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、云南、西藏、香港；原苏联，伊朗，阿富汗；欧洲，非洲。

(377) 黄跗斑眼蚜蝇 *Eristalinus quinquestriatus* (Fabricius, 1794) (图 294)

Syrphus quinquestriatus Fabricius, 1794: 289.

Eristalis pictus Macquart, 1846: 258, 130.

Eristalis aesepeus Walker, 1849: 625.

Lathrophthalmus quinquestriatus (Fabricius, 1794): Sun, 1987: 1189.

Eristalinus quinquestriatus (Fabricius, 1794): Knutson *et al.*, 1975: 349; Peck, 1988: 184; Huang, 1992: