

(380) 绿黑斑眼蚜蝇 *Eristalinus viridis* (Coquillett, 1898)

Eristalis viridis Coquillett, 1898: 326.

Eristalinus viridis (Coquillett, 1898): Peck, 1985: 184; Sun, 1993: 1110; Huang *et al.*, 1996: 184.

体长 10-12mm。

雄性 体亮绿黑色或金属绿色。头顶三角大，黑色，毛黑色；额绿黑色，具光泽，两侧覆黄白色粉被和淡黄毛；颜黑绿色，覆灰色粉被及黄毛，中突裸，颜在触角基部下凹入深，下部两侧亮黑色，裸；后头黑色，淡色毛长。触角黄色至棕黄色，第3节背腹侧稍带黑色；芒与触角同色，基部色略暗，裸。中胸背板深黑色，具5条铜色或绿色光泽纵条，正中条细狭，正中亚中条较宽，与背板后缘铜黑色宽带相连；小盾片亮绿黑色；侧板黑色；胸部被毛黄色或黄褐色。腹部与胸部等长，宽于胸；第1背板亮绿黑色，中部暗棕色或灰色；第2背板绒黑色，两侧各具1亮铜色或绿黑色大形斑，斑外端几乎占整个背板侧缘，内端弧形，背板正中绒黑色部分呈“T”字形，均不达背板侧缘，后缘与侧斑同色；第3背板与前节相同，侧斑大，两斑间狭分离，背板几乎全铜绿色，正中绒黑斑近“Λ”形；第4背板亮铜绿色，仅正中具极小的绒黑色斑；尾节亮绿黑色。足黑色，腿节末端、胫节基半部及后足胫节基部1/3黄色；前、中足跗节基部1-2节略带红棕色，有时不明显；足毛主要淡色，后足腿节端部腹面和后足胫节具短黑鬃。翅透明，翅痣具1小黄斑。平衡棒黄色。

雌性 额黑色或亮绿黑色，前部覆棕黄色粉被，沿眼缘具1对黄白色长形粉被斑，额毛黑色，前半部毛黄褐色。第3背板绒黑斑小，第4背板无绒黑色。

共检查81号标本：

江苏(上海, 1918.VI.29-1934.VI.30, 26个)、浙江(舟山, 1930.IV.26-1935.VI.4, 19个；天目山, 1937.VII-1961.IX, 7个)、福建(将乐, 650-800m, 1990.IX.11-1991.V.22, 6个)、湖北(利川, 810-1100m, 1989.VII.22, 1个)、广西(龙胜, 900m, 1963.VI.12, 1个)、四川(泸定, 1600-2000m, 1983.VI.12-17, 19个)、陕西(秦岭凤县, 1580m, 1973.VII.22-VIII.9, 2个)。

分布 江苏、浙江、福建、湖北、广西、四川、陕西、甘肃；日本。

我国有记载而未见标本的种类：

(381) 石桓斑眼蚜蝇 *Eristalinus ishigakiensis* (Shiraki, 1968) (图 295)

Lathyrophthalmus ishigakiensis Shiraki, 1968: 177.

Eristalinus ishigakiensis (Shiraki, 1968): Peck, 1988: 183.