

(摘译自 Brunetti, 1923)

分布 中国 (Frotier); 印度, 缅甸东北部。

(389) 平端管蚜蝇 *Eristalis flatiparamerus* Li, 1999 (图 299)

Eristalis (Eoseristalis) flatiparamerus Li, 1999: 211-213.

体长 11.5mm, 翅长 8.5mm。

雄性 头顶黑色, 被金色粉被和黄褐色毛; 额黑色, 被黄色粉被和直立淡黄色毛; 颜密被黄色粉被和淡黄色长毛, 中条纹亮黑色; 颊被白色粉被和同色毛。两复眼连线为头顶三角之半长。触角黑色; 芒长于触角, 羽毛状。中胸背板亮黑色, 被黄褐色毛; 小盾片褐色, 毛黄褐色; 侧板黑色, 被绿色粉被和淡黄色长毛; 后胸腹板被淡黄色长毛。腹部黑色, 被淡黄色毛; 第 1 节被灰色粉被; 第 2 节具 1 对不规则的四边形橙黄色斑, 该斑占据背板两侧, 且和黄色后缘相连, 背板中部尖, 形成象 “H” 形黑斑; 第 3 节前侧角具 1 对相似的三角形斑; 第 4 节黑色, 后缘橙色; 第 5 节黑色。足略弯曲; 足毛大部淡黄色, 前、中足腿节后腹面和后足腿节前背面毛很长。翅透明。(摘自 Li, 1999)

分布 青海(西宁)。




图 299 平端管蚜蝇 *Eristalis flatiparamerus* Li (仿 Li, 1999)

a. 头 (侧面观) (head in lateral view) b. 触角 (antenna) c. 雄性外生殖器 (male genitalia) d. 上叶 (superior lobe) e. 阳茎 (侧面观) (aedeagus in lateral view)