



图 301 黑颜管蚜蝇 *Eristalis nigriceps* Li (仿 Li, 1999)

a. 头 (侧面观) (head in lateral view) b. 触角 (antenna) c. 雄性外生殖器 (侧面观) (male genitalia in lateral view) d. 下生殖板 (侧面观) (hypandrium in ventral view) e. 阴茎 (侧面观) (aedeagus in lateral view)

(393) 萨克管蚜蝇 *Eristalis sacki* van der Goot, 1964

Eristalis sacki van der Goot, 1964: 220; Knutson *et al.*, 1975: 353.

Eristalomyia semisplendens Shiraki, 1930: 140-143.

体长 13-14mm。

头暗黑色，部分淡蓝色；头顶黑色，被同色长毛；额狭，钝黑色，覆同色粉被，毛短，黑色；颜覆灰白粉被和黄白毛，侧面观颜在额突下很凹入，中突圆。复眼裸，具 2 条不明显的暗条纹。触角褐黑色，第 3 节卵形，长于基部 2 节之和；芒长，黑褐色，基半部粗而裸，光亮。中胸背板黑色，中部具 1 明显的淡灰色横带，两侧被柠檬黄色毛，从背板前缘到横带具不明显的灰色中条纹，后面 1/3 青铜色；背板被黑色粗短毛，肩胛毛褐色，长，背板基部两侧被金黄色长毛，翅后胛毛黑色，有时具黄毛；小盾片基半部被黑色粉被，端半部亮青铜色，毛黄褐色，缘毛亮黄色；侧板黑色，毛黄褐色，中侧片具宽的淡黄色带。腹部暗褐色；第 1 节覆灰粉被，两侧被亮金黄色粗毛；第 2 节粉被黑色，中横带中等宽，中部宽中断，中部后缘具同色的三角形横带；第 3、4 节密覆黑色粉被，前缘具青铜色横带，后缘中部具三角形弯曲带，后缘具 1 个平三角形横带。翅褐色，顶端和后缘灰色；腋瓣色更亮些。平衡棒淡黄色。足亮黑色，胫节基部橙黄色；后足胫节弯曲；毛短粗，亮黄色，腿节毛明显长。

雄性 额被金属光泽和黑色长毛。胫节基部暗褐色。(摘译自 Shiraki, 1930)

分布 中国台湾。

62. 拟管蚜蝇属 *Pseuderistalis* Shiraki, 1930

Pseuderistalis Shiraki, 1930: 147. Type species: *Pseuderistalis bicolor* Shiraki, 1930.

属征 头半圆形；颜中突大，额具明显额突。复眼裸，雄性接眼，雌性离眼。触角裸。中胸背板具不明显的黄色横带。腹部近末端变狭，尖。翅短，具 1 个大中斑。

分布 东洋区。

我国有描述的种类共 2 种。

(394) 黑拟管蚜蝇 *Pseuderistalis nigra* (Wiedemann, 1824) (图版 VI: 1)

Eristalis nigra Wiedemann, 1824: 38.

Pseuderistalis nigra (Wiedemann, 1824): Knutson *et al.*, 1975: 458.

头顶三角黑色，被同色毛；额黑色，被黄色毛；颜黑色，覆黄色粉被和黄色短毛。触角淡褐色，第 3 节长略大于宽；芒裸，淡褐色。中胸背板黑色，被黄色毛，具 3 条不达盾沟的亮铜绿色纵条纹；小盾片黑色，被黄色毛。腹部黑色，被黄色毛；第 1 节背板具亮铜绿色横带，第 2、3 背板具亮铜绿色斑纹，前者斑纹较宽，且两斑相隔较宽，后者斑纹较前者狭，且相距较近，第 1、2 节背板后缘均为亮铜绿色。各足腿节绝大部分黑色，后足腿节几乎全黑色；胫节基半部黄色，后半部黑褐色；跗色黑褐色；足毛淡黄色，后足腿节顶端 1/3 外下侧、胫节顶端和跗节腹面具粗黑毛。翅褐色。腋瓣黄色，缘毛同色。

检查 1 号标本：

浙江(天目山, 350-1100m, 1963.V.4, 1 个)。

本种为我国新记录种。

分布 浙江(天目山)

我国有记载而未见标本的种类：

(395) 双色拟管蚜蝇 *Pseuderistalis bicolor* Shiraki, 1930 (图 302)

Pseuderistalis bicolor Shiraki, 1930: 148-151; Knutson *et al.*, 1975: 358.

体长 14-17mm。