

- 3. 头部整个密被明显的黄色直立毛(包括复眼).....冲绳平颜蚜蝇 *E. okinawaensis*
头部无明显黄毛, 复眼近乎裸..... 4
- 4. 腹部细长, 基部具 2 对红黄色斑, 第 1 对斑大, 其上具“八”字形淡色粉被斑.....
.....闪光平颜蚜蝇 *E. lucidus*
腹部粗壮, 具 3 对大小相等的白粉被斑..... 5
- 5. 后足腿节基部具瘤状突起疣腿平颜蚜蝇 *E. tuberculatus*
后足腿节基部无瘤状突起洋葱平颜蚜蝇 *E. strigatus*

(439) 黄边平颜蚜蝇 *Eumerus figurans* Walker, 1860 (图版 VI: 10)

Eumerus figurans Walker, 1860: 120-121; Knutson *et al.*, 1975: 341.
Eumerus marginatus Grimshaw, 1902: 82.

体长 8-9mm。

体粗壮, 密被粗刻点。雄性头顶三角很长, 黑色, 单眼三角亮黑色, 着生较前, 其前方覆黄粉被和毛, 单眼后方具铜色光泽, 被黄毛; 额、后头和颜密覆银白色粉被和毛; 后头宽, 顶部中央裸。复眼裸, 中胸背板亮黑色, 密具刻点和黄短毛, 沿盾沟具 1 对银白色粉被短横带; 侧板被灰白色粉被和同色较长毛; 小盾片黑色, 具刻点, 毛黄色, 直立, 小盾片后缘具宽的黄薄边。腹部黑色, 被刻点; 第 2-4 节各具 1 对斜的银白色粉被横带; 第 2 节后部至第 4 节前部混有黑短毛, 腹背毛大部分黄色。足基节和转节褐色; 腿节黑色, 腿节末端、前、中足胫节基部及跗节黄色, 前、中足胫节后半部黑色或黑褐色, 后足胫节基部 1/3 黄色, 端部 2/3 黑色, 基跗节黑色, 其末端及其他几节红褐色; 足毛黄白色, 腿节和胫节外侧毛较长; 后足腿节粗大, 端部具发达的 2 排粗大黑刺, 外侧脊明显, 内侧脊不发达, 胫节中、端部加粗。翅透明, 翅痣黄色。

共检查 12 号标本:

福建(崇安三港, 800m, 1960.VIII.20, 1 个; 福安, 1963.VIII.25, 1 个)、海南(1934.VIII.19, 1 个; 通什, 340m, 1960.IV.26, 5 个)、四川(峨眉山报国寺, 550-750m, 1957.V.10, 2 个)、云南(金平, 420m, 1956.IV.21, 1 个)、Musha F (1935.VII.5, 1 个)。

分布 福建、广西、海南、四川、云南、台湾; 东洋区。

(440) 闪光平颜蚜蝇 *Eumerus lucidus* Loew, 1848 (图 328)

Eumerus lucidus Loew, 1848: 134; Peck, 1988: 158; Huang *et al.*, 1996: 181.

体长 6-8mm。

体亮黑色。头黑色, 覆银白色至黄色毛; 头顶三角狭, 端尖; 颜狭, 两侧平行, 粉

初二校