

坪, 1200m, 1983.VIII.2, 1 个; 汶川映秀, 900m, 1983.IX.15, 1 个; 壁山, 1971.VI.15, 2 个; 西昌, 1984.VIII.3, 1 个)、云南(中甸冲江河, 2400m, 1984.VIII.4, 1 个; 景谷, 930m, 1955.IV.23, 3 个; 西双版纳勐仑, 580m, 1993.IX.8, 1 个; 景东, 1170m, 1956.VI.20, 1 个)、香港(Kowloon, 1932.XII.9, 1 个)。

**分布** 北京、河北、山西、内蒙古、吉林、浙江、江西、山东、湖北、四川、云南、香港; 原苏联(中亚); 欧洲。

**(441) 冲绳平颜蚜蝇 *Eumerus okinawaensis* Shiraki, 1930**

*Eumerus okinawaensis* Shiraki, 1930: 98; Peck, 1988: 160; Huang *et al.*, 1996: 181.

**体长** 6-7mm。

头黑色, 密被亮黄色直立长毛; 头顶黑色, 单眼三角着生较前, 单眼三角前密覆黄粉被并沿眼缘向后扩展; 额和颜密覆黄粉被; 后头黑色, 覆黄粉被及毛。复眼密被黄长毛。触角黄色, 第 3 节宽大, 上侧角圆, 下侧角突出; 芒黑色。中胸背板黑色, 略具光泽, 密被黄色直立长毛, 背板前部具 1 对灰白色粉被中条; 小盾片及侧板同背板, 小盾片无盾下毛。腹部黑色, 具光泽; 第 2 节中部具 1 对大的三角形黄斑, 该斑不达背板侧缘; 第 3 节具 1 对黄斜带, 其上覆白粉被; 第 4 节具 1 对白粉被斜条, 该斜条呈“八”字形, 有时斑不明显。足黑色; 各足腿节末端、前、中足胫、跗节黄色, 胫节近端部具黑环或黑斑, 后足胫节基半部及末端、跗节端部 4 节黄色, 基跗节背面黑褐色, 腹面红黑色, 有时跗节整个黄色; 后足腿节不膨大或稍膨大, 端部 1/3 下侧具 2 排粗大的黑刺; 胫节中、后部加粗, 后足端跗节有时很宽阔。翅透明。

共检查 12 号标本:

内蒙古(扎兰屯, 1937.VII.30, 1 个)、辽宁(Tokurigi, 1937.VIII.23, 1 个)、福建(福州, 1955.V.13, 1 个)、广西(凭祥, 230m, 1963.IV.11, 2 个)、海南(1934.VI.12, 1 个)、云南(西双版纳勐海, 580m, 1993.IX.8, 1 个, 1200-1600m, 1957.IV.24, 1 个, 1958.VII.25, 1 个; 大勐龙, 1994.IX.4, 1 个; 思茅, 1390m, 1957.V.10, 1 个)、西藏(墨脱背崩, 850m, 1983.VII.17, 1 个)。

**分布** 内蒙古、辽宁、福建、广西、海南、云南、西藏; 日本。

**(442) 红腹平颜蚜蝇 *Eumerus sabulonum* (Fallén, 1817)**

*Pipiza sabulonum* Fallén, 1817: 61.

*Eumerus selene* Meigen, 1822: 210.

*Eumerus rubriventris* Macquart, 1829: 267.

*Eumerus litoralis* Curtis, 1839: 749.