

Eumerus sabulonum (Fallén, 1817): Peck, 1988: 162; Huang *et al.*, 1996: 181.

体长 9mm。

头黑色，具光泽；头顶毛黑色，短；额两侧平行，颜下部逐渐加宽；额和颜毛黄白色；后头宽，黑色，中、下部沿眼缘具黄褐色粉被带。触角短，红黑色，具黄褐色粉被；芒裸，黑褐色。中胸背板黑色，略具光泽，密被刻点及黄褐色毛，背板前部中央具1对灰色粉被纵条，肩胛和翅后胛红褐色；小盾片及侧板同背板。腹部整个红黄色，基部及端部色暗，第2-4节各具1对银白色粉被及呈“八”字形毛带。足黑色或黑褐色，腿节末端及胫节基部黄褐色，后足色暗，前、中足跗节基部3节黄黑色，后足腹面白黄色；后足腿节加粗，端半部下侧具粗大的黑刺，胫节后半部膨大。翅略呈褐色，无明显斑。

检查2号标本：

甘肃(1935.V.3, 2个)。

分布 甘肃；原苏联；欧洲，北非。

(443) 洋葱平颜蚜蝇 *Eumerus strigatus* (Fallén, 1817)

Pipiza strigatus Fallén, 1817: 61.

Eumerus funeralis Meigen, 1822: 208.

Eumerus grandicornis Meigen, 1822: 208.

Eumerus lunulatus Meigen, 1822: 209.

Eumerus planifrons Meigen, 1822: 209.

Eumerus aeneus Macquart, 1829: 209.

Eumerus melanopus Rondani, 1857: 269.

Paragopsis griseofasciatus Matsumura, 1916: 250.

Eumerus strigatus (Fallén, 1817): Peck, 1988: 162; Huang *et al.*, 1996: 181.

体长 5-7mm。

雄性 体黑色，具光泽。头顶三角宽大，略呈钝三角形，铜黑色，光亮，毛黑色；头顶及后头毛淡色；颜较平，不突出，密覆淡粉被和较粗毛。复眼具稀短而明显的毛。触角很宽大，暗棕色至黑褐色，第3节中部棕红色。中胸背板暗绿色，具金属光泽，正中两侧各具1较狭灰白色粉被纵条，该纵条不达小盾沟，毛淡色，较短。腹部黑色，略具绿色光泽，两侧较平行；第2-4背板各具1对狭长的“八”字形斑，正中完全分开，两侧不达背板侧缘；背板毛短，细，中间毛黑色，两侧、斑纹及第4背板端半部具白毛。足腿节黑色，腿节末端、胫节基部、中足跗节基部3节棕黄色，前、后足跗节及中足跗节端部2节暗棕色；足毛大部淡色；后足腿节粗大，端半部腹面具2列短齿；后足胫节

端部 2/3 稍粗大，略弯曲。

雌性 额黑绿色，具金属光泽，被淡色细长毛，两侧沿眼缘覆黄色粉被。

共检查 46 号标本：

内蒙古(大兴安岭大杨树, 1970.VII.18, 1 个; 凉城, 1980.VII, 2 个; 乌盟, 1961.VIII.6, 1 个)、江苏(上海, 1910.VI.17-IX.10, 2 个, 1919.VII.19, 1 个, 1925.VII.18-VIII.7, 1 个, 1931.V.12-16, 6 个, 1932.VIII.26, 1 个)、浙江(舟山, 191931.V.13-1936.V.12, 5 个)、山东(泰山, 1973.VI.14, 1 个、青岛崂山林场, 1975.IX.23, 4 个)、云南(自治县, 1957.VIII.5, 1 个; 景洪大勐龙, 650m, 1994.IV.4, 1 个; 维西攀天阁, 2500m, 1981.VII.26, 1 个)、新疆(乌鲁木齐, 20-800m, 1958.V.19, 1 个; 塔城, 1955.VII.20, 2 个, 470m, 1960.IX.10, 1 个; 库尔勒, 1000m, 1958.VII.13, 1 个; 阿克苏, 1210-1240m, 1958.IX.7, 1 个; 石河子, 590m, 1959.VIII.24, 6 个; 阿勒泰, 1956.VIII.30, 2 个; 吐鲁番, 20-140m, 1958.VI.8, 1 个; 焉耆, 750-1170m, 1958.VIII.24, 2 个; 伽师, 1160m, 1959.VII.5, 1 个; 玛纳斯, 400-590m, 1959.VIII.28, 1 个)。

分布 内蒙古、江苏、浙江、山东、云南、甘肃、新疆; 原苏联, 蒙古国; 欧洲, 北非, 北美洲。

(444) 疣腿平颜蚜蝇 *Eumerus tuberculatus* Rondani, 1857

Eumerus tuberculatus Rondani, 1857: 93; Peck, 1988: 164; Huang *et al.*, 1996: 181.

体长 6-8mm。

头黑色; 头顶三角长, 单眼三角毛黑色, 其后毛黄色和前部覆黄色粉被; 额和颜密覆白粉被和毛, 颜下部明显加宽。雄性复眼被稀短毛, 雌性复眼裸。触角黑褐色, 第 3 节基部下侧红褐色。中胸背板黑色, 略具光泽, 具 1 对灰白色粉被纵条和黄褐色直立短毛; 小盾片及侧板被毛同背板。腹部黑色, 略具铜色光泽, 密被刻点; 第 2-4 节各具 1 对白色粉被斜带, 该带呈“八”字形, 其上具白毛。腹部基部和端部及两侧毛白色, 中部黑色, 两侧毛长。足黑色, 腿节极末端及胫节基半部红褐色, 跗节背面黑褐色, 腹面黄褐色; 后足腿节加粗, 基部腹面具瘤状突起。翅透明。

共检查 47 号标本：

河北(蔚县, 960m, 1964.VI.5, 1 个)、内蒙古(乌盟, 1971.VI.17-18, 2 个; 呼和浩特, 1963.IV, 18 个; 集宁, 1971.VIII.1, 2 个; 凉城井沟, 1980.VII, 1 个; 商都, 1971.VI.18, 14 个)、黑龙江(哈尔滨, 1954.V.29, 1 个; 爱辉, 1971.VII.3, 1 个; 伊春, 1970.IX.2, 1 个; 泰来, 1 个)、新疆(乌鲁木齐, 20-890m, 1957.V.29, 3 个; 富蕴, 1200m, 1960.VIII.11, 1 个; 石河子, 590m, 1959.VII.27, 1 个)。

分布 河北、内蒙古、黑龙江、甘肃、新疆; 蒙古国, 原苏联; 欧洲, 北美洲。