

体长 11.0mm, 翅长 8.0mm。

**雄性** 头顶后缘无粉被; 额角接近  $90^\circ$ , 额毛长, 触角上方具不明显的褐斑; 颜毛黄色, 沿中突两侧具少许黑毛, 侧面观中突上下不对称, 中条与口缘褐色。触角深橘黄色, 第 3 节长椭圆形, 上缘淡褐色。中胸背板黑色, 具较强金属光泽, 被橘黄色长毛, 两侧具界限模糊的金黄色粉条; 小盾片桔黄色, 周缘被同色长毛, 中域毛黑色。腹部第 2 节背板具 1 对近似椭圆形黄斑; 第 3、4 节背板各具 1 条黄色横带, 带前缘两侧凹进, 后缘中部深凹, 前缘中部微凹, 前 1 条黄带较宽, 其宽度约大于分隔两条黄带间黑带宽度的 2 倍; 第 5 节背板黄色, 中部具 1 黑色狭横条; 第 2-4 节背板上黄斑及黄带的前侧角均超过背板侧缘。前、中足腿节基部 1/4、后足腿节基部 1/3 外侧下缘黑色; 后足胫节亚中部具不明显的狭窄黑环; 前、中足附节中部 3 节背面及后足全部跗节背面褐色; 前足腿节端部 2/3 处长毛为黑色。微毛复盖翅膜的大部分。翅瓣全部被毛。(摘自 He, 1993)

分布 黑龙江(尚志县帽儿山)。

**(127) 北方优食蚜蝇 *Eupeodes borealis* He, Zhang et Sun, 1997 (图 92)**

*Eupeodes (Eupeodes) borealis* He, Zhang et Sun, 1997: 126.

体长 12.0-12.5mm。

**雄性** 头顶三角覆黄白色粉被; 额角  $90^\circ$ , 在触角上方无明显褐斑; 颜两侧略平行, 下方无黑毛, 侧面观颜中突上下不对称, 中条与口缘黑褐色; 颊黑色, 被淡黄色毛。触角深橘黄色, 上缘褐色。中胸背板黑色, 具较强的金属光泽, 被橘黄色长毛, 两侧具界限模糊的金黄色粉条; 小盾片中域被黑毛, 四周黄毛。腹部第 2 背板中部具 1 对近似三角形黄斑; 第 3、4 节背板各具 1 条黄横带, 带之前缘中央及两侧微凹, 而在后缘正中部深凹, 前侧角接近背板前缘, 前 1 条黄带较宽, 其宽度稍胜于分隔两条黄带间黑带的宽度; 第 5 背板中部具 1 三角形黑斑, 所有黄斑及黄带的前侧角均超过背板侧缘。前、中足腿节基部 1/3、后足腿节基部 3/5 黑色。前足跗节基部 4 节背面、中足跗节中部 3 节背面及后足跗节最后 4 节背面黑色。前足腿节端部 2/3 处长毛为黑色。翅膜中室和肘室全被微毛, 无裸区。翅瓣全部被毛。(摘自 He et al., 1997)

分布 辽宁(本溪汤沟)。

**(128) 郑氏优食蚜蝇 *Eupeodes chengi* He, 1992 (图 93)**

*Eupeodes (Eupeodes) chengi* He, 1992: 302-303.

体长 10.0mm, 翅长 7.0mm。

**雄性** 额在触角基部上方具淡褐色斑, 额角  $85^\circ$ ; 颜下方无黑毛, 颜中突上下不对